ETHEPHON 39% S.L.

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified on This Label/leaflet".

Introduction : A plant Growth regulator is proved to be an effective Hormone spray for achieving the following functions. 1) Inducing flowering, 2) Inducing ripening,3) Enlarging fruit size, 4) Increasing yield, 5) Inducing bud sprouting etc.

Recommendation :

CROPS	USE	DIRECTIONS
Grape	Inducing ripening Enlarging size	200 ppm 2-3 weeks before harvest
Apple	Inducing flowering Inducing ripening and size	200 ppm pre-bloom spray 50-100 ppm 2 weeks before enlargemenrharvest
Mango	Breaking altemate bearing tendencies	200 ppm spray at fort ningtly intervals by Oct. or early Nov. 4-5 sprays.
Pineapple	Inducing flowering Inducing ripening size enlargement	100 ppm 10-12 month after Planting 100 ppm spray 2 week store harvest induce ripening
Coffee arabica	Inducing ripeing	200 ppm spray
Coffee robusta	Inducing ripeing	100 ppm spray
Orange	Inducing ripeing	200 ppm on well developed fruits
Sugarcane	Inducing ripeing	1000 ppm 4-6 weeks before harvest

Preparation of spray solution : One ml. of this in one litre of water gives 480 ppm; alkaline water should not be used.

Compatibility : Not compatible with other chemical

Phytotoxicity : It is safe on crops in recommended doses.

Toxicity : Relatively Non-toxic to man or mammal the acute oral LD to rats being 4229 mg. per kg of body weight.

Symptoms of poisoning : Harmful if swallowed. irritates skin. eyes and mucuous membrane. Avoid contact with skin. eyes or clothing.

First Aid : In case of skin contact wash immediately with soap and water. In case of flushing into the yes flood the eye with plenty of water. If swallowed induce vomiting by inserting fingers into the throat. call the physician.

Antidote : There is no specific antidote. Symptomatic treatment may be given.

Caution : Keep out of reach of children food stuff and animal feeds.

Storage : Packages containing the material shall be stored in cool, dry and well ventilated places away from other articles. Depending upon the quantities it can be stored in almirah under lock and key on in well built, dry and well ventilated rooms.

Transportation : Packages containing the material shall be transported in such a way as to avoid contamination of food-stuff and animal feeds.

Disposal of containers : The Packages shall be broken and burried away from habitation. Packages should not be left outside to prevent their re-use. The empty containers, surplus material and washings should be disposed off in such a safe manner as to prevent environment and water pollution.

Warranty : The product is of high grade, Since its use is not under the direct control, neither the manufacturer nor the distributor makes any warranty except the purity and the quantity of the active ingredient as shown on the label.

इथेफोन ३९% एस.एल.

चेतावनी : इस लेबल/हस्तपत्रिका मे दी गई फसलो के अलावा अन्य कोईभी फसल पर इसका उपयोग ना करें ।

इथेफोन में पेड़ पौधों के लिये अनेक उपयोगी तत्व हैं, जो कि अनेकों प्रकार से लाभदायाक हैं जैसे १) फूलों की संख्या में वृद्धि । २) फल पकाने के लिये । ३) आकार बढ़ाने के लिये । ४) उत्पादन बढ़ाने के लिये एवं फुटाव के लिये । स्प्रे बनाने का तरीका : १ मि.ली. इथेफोन १ लिटर पानी में ४८० पी. पी.एम. देता है । स्प्रे बनाने के लिये जो पानी लेना है, वह खारा नहीं होना चाहिए ।

सिफारिशें :

उपज	उपयोग	निर्देश
अंगूर	पकाने के लिये और आकार बढ़ाने के लिये	लवन के दो हफ्ते पहले २०० पी.पी.एम. देने से बड़ा और आकर्षक फल मिलता है।
सेब	फूल आने की प्रेरणा तथा पकाने के लिये और आकार बढ़ाने के लिये	फूल आने से पहले २०० पी.पी.एम. ५०-१०० पी.पी.एम. लवन के दो हफ्ते पहले
आम	विकलापता दूर करने के लिये	२०० पी.पी.एम. अकदूवर या नवम्बर से दो हफ्ते में एक बार फूल आने तक
अनानास	फूल आने के लिये एवं आकार बढ़ाने के लिये और पकाने के लिये	१०० पी.पी.एम. प्लान्टिंग करके १०-१२ महीने के बाद १०० पी.पी.एम. स्प्रे दो हफ्ते पहले।
कॉफी अरबिका	पकाने के लिये	२०० पी.पी.एम. पूर्ण विकसित फल पर दो हफ्ते पहले ।
कॉफी रोबस्टा		पकाने के लिये १०० पी.पी.एम.
सन्तरा	पकाने के लिये	२०० पी.पी.एम. पूर्ण विकसित फल पर ।
गन्ना	पकाने के लिये	१०० पी.पी.एम. ४-६ हफ्ता पहले

संगति अनुकूलता : इसके साथ अन्य रसायन मत मिलाइये ।

वानस्पतिक विषाक्तता : सिफारिशें किऐ हुये प्रमाणो में यह कोई हानि नहीं करती हैं । यह ज्यादा डोवसिक नहीं है । एल.डी. चूहे के लिये ४२२९ मि.ग्रा./किलो भार है ।

विष प्रभाव के लक्षण : निगलता खतरनाक हैं । त्वचा और आंख में पड़ने पर खुजली होगी ।

सावधानियां : बच्चों से दूर रखिये । खाने का पदार्थ, पशु पक्षियों के खाने से दूर रखिये । निगलना खतरनाक हैं । आंख त्वचा और कपड़े में लगना नहीं चाहिये ।

एन्टिडोट : लक्षण के अनुसार चिकित्सा करें । खास एन्टिडोट कोई नहीं।

प्राथमिक चिकित्सा : अगर निगल गया तो गले में अंगुली डाल कर उल्टी कीजिये । आधा गिलास पानी में दो चम्मच नमच डालकर पिलाइये । वोमिट. फलूईड साफ होने तक यही दे दीजिये अगर आंख में लगा तो खूब पानी से धो लीजिये । त्वचा में पड़ने पर साबून से धो लीजिये ।

खाली डिब्बों का निपटारा : डिब्बो या बची हुई दवा तथा धोलन को इस तरह मिटाना चाहिये जिससे आसपास की चीजो या पानी विशैला न होने पाए ।

प्राधीकार : यह उत्तम किस्म का है । इस का परिणाम और परिशुद्ध के अलावा निर्माता व विक्रता पर कोई गारन्टी नहीं देता हैं ।

ইথেফোন ৩৯% ঝ.খ.

উদ্ভিদ বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক

সতর্কতা: "অন্য ফসলে ব্যবহার করা যাবে না এই লেবেল/লিফলেটে নির্দিষ্ট করার চেষ্ট"।

ভূমিকা: একটি উদ্ভিদ বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক নিম্নলিখিত ফাংশন অর্জানের জন্য একটি কার্যকর হরমোন স্প্রে হিসাবে প্রমাণিত হয় ।

১) ফুল ফোটানো, ২) পাকাতে প্রারোচিত করা, ৩) ফলের আকার বড় করা, ৪) ফলন বৃদ্ধি করা, ৫) কুঁড় অঙ্কুরিত করা ইত্যাদি ।

স্প্রে দ্রবণ প্রস্তুত: এক মিলি. এর মধ্যে এক লিটার জলে ৪৮০ পিপিএম দেয়; রীয় জল ব্যবহার করা উচিত নয় ।

সুপারিশ:

ফসল	ব্যবহারের	দিকনির্দেশ
গ্রেপ	ইনডুসিং বড় আকারের	২-৩ সপ্তাহ আগে ২০০ পিপিএম পাকা ফসল
আপেল	ইন্ডুসিং ফ্লাওয়ারিং ২ সপ্তাহ আগে এবং আকার	২০০ পিপিএম প্রি-ব্লুম স্প্রে ৫০-১০০ পিপিএম পাকাতে প্রারোচিত করা বৃদ্ধি ফসল
ম্যাঙ্গো	ব্রেকিং অ্যাটেমেট অক্টোবর বা নভেম্বরের	২০০ পিপিএম স্প্রে করন্ন প্রথম দিকে ভারবহন প্রবণতা ব্যবধান। ৪-৫ স্প্রে ।
আনারস রোপণ	ফুল ফোটান বরাবরহরম প্রারোচিত আকার বৃদ্ধি ২	১০০ পিপিএম ১০-১২ মাস পর ১০০ পিপিএম স্প্রে সপ্তাহের লোকান যধংংঃ প্রারোচিত বরাবরহরম
কফি আরবিকা	ইন্ডুসিং পাকা	২০০ পিপিএম স্প্রে
কফি রোবাস্তু	ইনডিউসিং পাকা	১০০ পিপিএম স্প্রে
কমলা	ভালোভাবে পাকাতে	২০০ পিপিএম উন্নত ফল
পাকা হয়	আগে আখ	১০০০ পিপিএম ৪-৬ সপ্তাহ ফসল

সামঞ্জস্যতা: অন্যান্য রাসায়নিকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় ।

ফাইটোটক্সিসিটি: এটি সুপারিশকৃত মাত্রায় ফসলের জন্য নিরাপদ ।

বিষাক্ততা: তুলনামূলকভাবে মানুষ বা স্তন্যপায়ী প্রাণীর জন্য অ-বিষাক্ত, তীব্র মৌখিক খউ থেকে ইঁদুর ৪২২৯ মিগ্রা । শরীরের ওজন প্রতি কেজি ।

বিষক্রিয়ার লণ: গিলে ফেললে তিকর । ত্বক জ্বালা করে । চোখ এবং শ্লেষ্মা ঝিল্লি । ত্বকের সাথে যোগাযোগ এড়িয়ে চলুন । চোখ বা পোশাক ।

প্রাথমিক চিকিৎসা:

ত্বকের সংস্পর্শের ত্রেে অবিলম্বে সাবান এবং জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন । হ্যাঁ ফ্লাশ করার ত্রেে প্রচুর জল দিয়ে চোখ বন্ধ করন্ন । গিলে ফেললে গলায় আঙ্গুল ঢুকিয়ে বমি করান । চিকিৎসককে ডাকুন ।

প্রতিষেধক: কোন নির্দিষ্ট প্রতিষেধক নেই । লণীয় চিকিৎসা দেওয়া যেতে পারে ।

সতর্কতা: শিশুদের খাদ্য সামগ্রী এবং পশুখাদ্যের নাগালের বাইরে রাখুন ।

সঞ্চয়স্থান: উপাদান ধারণকারী প্যাকেজ অন্যান্য নিবন্ধ থেকে দূরে শীতল, শুষ্ক এবং ভাল বায়ুচলাচল জায়গায় সংরক্ষণ করা উচিত, পরিমাণের উপর নির্ভর করে এটি আলমিরায় তালা এবং চাবির নীচে ভালভাবে নির্মিত, শুকনো এবং ভাল বায়ুচলাচলযুক্ত ঘরে সংরক্ষণ করা যেতে পারে ।

পরিবহন: উপাদান সম্বলিত প্যাকেজগুলিকে এমনভাবে পরিবহণ করতে হবে যাতে খাদ্যদ্রব্য এবং পশুখাদ্য দূষিত না হয় ।

পাত্রের নিষ্পত্তি:

প্যাকেজগুলি ভাঙ্গা হবে এবং বাসস্থান থেকে দূরে কবর দেওয়া হবে । তাদের পুনরায় ব্যবহার রোধ করতে প্যাকেজগুলিকে বাইরে রাখা উচিত নয় । খালি পাত্র, উদ্বৃত্ত উপাদান এবং ওয়াশিংগুলি এমন নিরাপদ পদ্ধতিতে নিষ্পত্তি করা উচিত যাতে পরিবেশ এবং জল দূষণ রোধ করা যায় ।

ওয়ারেন্টি:

পণ্যটি উচ্চ গ্রেডের, যেহেতু এটির ব্যবহার সরাসরি নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়, প্রস্তুতকারক বা পরিবেশক কেউই লেবেলে দেখানো সক্রিয় উপাদানের বিশুদ্ধতা এবং পরিমাণ ছাড়া কোনো ওয়ারেন্টি দেয় না ।

ଏଥଫୋନ୍ 39% S.L.

ନିମ୍ନଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ

ସତର୍କତା: "ଅନ୍ୟ ଫସଲରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ | ଏହି ଲେବେଲ୍ / ଲିଫଲେଟ୍ ରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଠାରୁ ଅଧିକ |

ପରିଚୟ: ନିମ୍ନଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉଦ୍ଭିଦ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହରମୋନ୍ ସ୍ପ୍ରେ ପ୍ରମାଣିତ |

1) ଫୁଲଙ୍କୁ ପ୍ରରବର୍ତ୍ତାଇବା, 2) ପାଚିବା, 3) ଫଳର ଆକାର ବୃଦ୍ଧି, 4) ଅମଳ ବୃଦ୍ଧି, 5) କଦଳୀ ଫୁଟିବା ଇତ୍ୟାଦି |

ସ୍ପ୍ରେରେ ସମାଧାନର ପ୍ରସ୍ତୁତି: ଗୋଟିଏ ମି.ଲି. ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଲିଟର ପାଣିରେ 480 ppm ବରେଥାଏ; କ୍ଷାରୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ |

ସୁପାରିଶ:

କ୍ରପ୍	ବ୍ୟବହାର	ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା
ଅଙ୍ଗୁର	ଆକାର ଅମଳ ବୃଦ୍ଧି	2-3 ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ 200 ppm ପାଚିବା
ଆପଲ୍	ଫୁଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରରବର୍ତ୍ତାଇବା	200 ppm ପ୍ରି-ବ୍ଲୁମ୍ ସ୍ପ୍ରେ | 2ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ 50-100 ppm ପାଚିବା ଏବଂ ଆକାର ବୃଦ୍ଧି ଅମଳ
ଆମ୍ବ	ବ୍ରରକିଟ୍ସ୍	
	ଅକ୍ଟୋବର କିମ୍ବା	ନଭେମ୍ବର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ପ୍ରରବୃତ୍ତିର ଅନ୍ତରରୁତ୍ତିକ ବହନ କରେ	4-5 ସ୍ପ୍ରେ
ଏନିଆ	ପତ୍ର 100 ppm ପାଚିବା ପାଇଁ	10-12 ମାସ ପରେ ଫୁଲ ପ୍ରରବାହିତ କରେ
	ଶୀଘ୍ର ପ୍ରରବର୍ତ୍ତାଇବା	100 ppm ସ୍ପ୍ରେରେ ଲଗାଇବା
		ଆକାର ବୃଦ୍ଧି 2 ସପ୍ତାହ ଖରେ ରାରେ ପାଚିବା
କଫି ଆରବିକା		200 ppm ସ୍ପ୍ରେରେ ପାଚିଲା
କଫି robusta		100 ppm ସ୍ପ୍ରେରେ ପାଚିଲା
କମଳାରେ		200 ppm ପାଚିଲା କମଳା	ବିକଶିତ ଫଳ
ଆଖୁ		4-6 ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ 1000 ppm ପାଚିଲା	ଅମଳ

ସୁସଙ୍ଗତତା: ଅନ୍ୟ ରାସାୟନିକ ସହିତ ସୁସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ |

ଫାଇଟୋଟକ୍ସାଲିସିଟି: ପରାମର୍ଶିତ ମାତ୍ରାରେ ଫସଲ ଉପରେ ଏହା ନିରାପଦ ଅଟେ |

ବିଷାକ୍ତତା: ମନୁଷ୍ୟ କିମ୍ବା ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପେକ୍ଷିକ ଅଣ-ବିଷାକ୍ତ LD ରୁ 4229 ମିଗ୍ରା | ଶରୀରର ଓଜନ ପ୍ରତି କିଲୋ ରାରାମ |

ବିଷର ଲକ୍ଷଣ: ଗିଳିଲେ ବ୍ୟତିକାରକ | ତତ୍ରମ୍ବ୍ରୁ ବିରକ୍ତ କରେ | ଆଖି ଏବଂ ମ୍ଯୁକୁସ୍ ମମ୍ବ୍ରେନ୍ | ତତ୍ରମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରୁ ବୁଝେଇ ରୁହନ୍ତୁ | ଆଖି କିମ୍ବା ଯୋଗାଯୋଗ |

ପ୍ରଥମ ସହାୟତା: ତତ୍ରମ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତରେ ପୁରନ୍ତ ସାବୁନ୍ ଏବଂ ପାଣିରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ | ହଁରେ ପ୍ରରବାହିତ ହେଲେ ଆଖିକୁ ପ୍ରଚୁର ପାଣିରେ ବନ୍ୟା କର | ଯଦି ଗିଳି ରାଜାରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଭର୍ତ୍ତି କରି ବାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରେ | ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡାକ |

ପ୍ରତିକାର: କ specific ଶିଷି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରତିକାର ନାହିଁ | ଲକ୍ଷଣ ଚିକିତ୍ସା ଦିଆଯାଇପାରେ |

ସତର୍କତା: ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ପଶୁ ଫିଡ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାନନ୍ତୁ ନାହିଁ |

ଭଣ୍ଡାର: ସାମଗ୍ରୀ ଧାରଣ କରିଥିବା ପ୍ୟାକେଜଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ଆର୍ଟିକିଲ୍‌ଠାରୁ ଦୂରରେ ଥଣ୍ଡା, ଶୁଷ୍କ ଏବଂ ଭଲ ଚାଳିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯିବ | ପରିମାଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଏହା ଆଲମିରାରେ ଲକ୍ ଚାବି ଏବଂ ଚାବି ଭଲ ଭାବରେ ନିର୍ମିତ, ଶୁଖିଲା ଏବଂ ଭଲ ଚାଳିତ କକ ।ରାରେ ରଖାଯାଇପାରିବ |

ପରିବହନ: ସାମଗ୍ରୀ ଧାରଣ କରିଥିବା ପ୍ୟାକେଜଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ଉପାୟରେ ପରିବହନ କରାଯିବ ଯେପରି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ପଶୁ ଫିଡ୍‌ର ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଏଡାଇ ଦିଆଯିବ |

ପାତ୍ରର ନିଷ୍ପତ୍ତି: ପ୍ୟାକେଜଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଏବଂ ବାସସ୍ଥାନଠାରୁ ଦୂରରେ ପୋତି ଦିଆଯିବ | ସମୋନ୍ତରେ ପୁନ use ବ୍ୟବହାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପ୍ୟାକେଜଗୁଡ଼ିକ ବାହାରେ ଛାଡିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ | ଖାଲି ପାତ୍ର, ଅତିରିକ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଧୋଇବା ପରିବେଶ ଏବଂ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏକ ନିରାପଦ manner ଦ୍ୱାରେ ନିଷ୍କାସନ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ |

ୱାରେଣ୍ଟି: ଉତ୍ପାଦଟି ଉଚ୍ଚ ଗ୍ରେଡ୍ ଅଟେ, ଯେହେତୁ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନାହିଁ, ଉତ୍ପାଦକ କିମ୍ବା ବିତରକ ଲେବେଲରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଶୁଦ୍ଧତା ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ଉପାଦାନର ପରିମାଣ ବ୍ୟତୀତ କ war ଶିଷି ୱାରେଣ୍ଟି କରନ୍ତି ନାହିଁ |

ইথেফোন ৩৯% এস.এল.

হেচ্যুচিক : জৈবপরিবর্তন করেছেমুলে পৈর্ত্যন্ত্র্য্য প্রিত্রপ্রিপ্রে এই মাধ্যমে ব্যবহার করা যাবে না।
মিগেজাপ্রিত্রপ্রে ব্যবহার করা যাবে না।

উদ্দেশ্য : এই দিগুর তৈলিপ্রিন চর্যুতন সাধ্যিকচেতনাকি এক প্রভাবশালী হোমোর্ন্যুল পিচিকারিন মোক্যুল বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ্রিত্রি নিরুপিতমোনাদি।

পুষ্পিণ্ডোলন চেয়াদেন : চক্রস্তরন তীসুকুরাবেটন-কায়া পরমাকান্যুন্যি পেদ্রদি চেয়াটন-দিগুরুদিনি পেন্চটোন-মোগ্রুল বিদ্যুবেটন মোদ্রলেনদি।

পিচিকারী তয়োরি : দীনিনি এক লীটরু নীটিলো এক মি.লী. লীটরুনু 480 পিপিএম্‌নু ইস্তুন্দি। অল্যুলিন্ নীটিনি ঊপয়োগিংচরাদু।

সিফারসু:

গ্রাক্ষ	পন্ডেলর চেস্তুন্দি কায় পরিমাকান্যুন্যি পেন্চুকুন্দি	পন্ট কোঁয়াটানিকি 2-3 বাপরাল মুন্দু 200 পি পি এম্
যাপিল্	পুষ্পিণ্ডোলর চেস্তুন্দি পন্ডেলর চেস্তুন্দি	পুষ্পিণ্ডেঁ কালানিকি মুন্দু 200 পি পি এম্ পন্ট কোঁয়াটানিকি 2 বারাল
মামিডি	ঊক পরিমাকান্যুন্যি পেন্চুকুন্দি কায়াল কানে দোঁরঙিনি অন্তং চেসি প্রতি সন্ডবৎসর কাপু	মুন্দু 50-100 পি পি এম্ অক্টোবরু লেদা নবন্দবরু নেল মোদলি বারুলোঁপু 15 রোঁজুলু ব্যুবধিতো 4-5 সার্দু 200 পিপিএম্‌নু পিচিকারী চেয়ালি.
অনাস	পুষ্পিণ্ডোলর চেস্তুন্দি পরিপক্বতকু তেস্তুন্দি কায় পরিমাকান্যুন্যি পেন্চুকুন্দি	মোক্কুনাটিনে 10-12 নেলল তরুবাত 100 পি পি এম্‌নু পন্ট কোঁয়াটানিকি 2 বারাল মুন্দু 100 পি পি এম্‌নু পিচিকারী চেয়াটন বল্লু পন্দু
কাফী অরবিকা	পরিপক্বতকু তেস্তুন্দি	পরিকারী চেয়াটন বল্লু পন্দু পরিপক্বতকু বস্তুন্দি. 200 পি পি এম্ পিচিকারী
কাফী রোবস্টা	পরিপক্বতকু তেস্তুন্দি	100 পি পি এম্ পিচিকারী
নারিঞ্জ	পরিপক্বতকু তেস্তুন্দি	বাগা এডিগিন কায়ালপৈ 200 পি পি এম্
চেরকু	পরিপক্বতকু তেস্তুন্দি	পন্ট কোঁয়াটানিকি 4-6 বারাল মুন্দু 1000 পি পি এম্

অনুকূলত : ইতর রসায়নালতো ঊপয়োগিংচটানিকি ইদি অনুকূলমোনদি কাদু.

ফ্লোটাক্ট্যুনিটী : পন্টলপৈ সিফারসু চেয়ুবডিন মোতাদুললো ইদি সুরক্ষিতং

বিষ প্রভাবং : সাপৈক্ষুকংগা চুস্তে মনিষিকি লেদা স্তন্যজাতী জন্তুবুলকু দীনিবল্ল এলাণ্টী বিষ প্রভাবংঊণ্ডদু. প্রতী কিলো শারীরিক ঊরুবুকু 4229 মি.গ্রা. চোঁয়্যুন এলুবলপৈ প্রয়োগিংচিনপুডু বিষ প্রভাবং কনিপিংচিন্দি.

বিষপ্রভাব লক্ষণালু : চ্রিংগিনট্টিতে প্রমাদকরং. চর্ম্মুপৈ মণ্ট, পুট্টুট, কন্ন্যু মণ্ডুট, মুক্কু কোরুট লাণ্টী লক্ষণালু কনিপিস্তুন্যি. চর্ম্মানিকি, কণ্ড্লুকু, দুস্তুলকু তগলকুণ্ডা জাগ্রত্তু পহিংচালী.

প্রথম চিকিত্স : চর্ম্মু পৈ পডিনট্টিতে, সরিপডিনন্নি নীৰ্ত্তোনু, সব্ব্যুতোনু শুদ্ধ্রপরচুকোনুবলেনু. কন্নুলো পডিনট্টিতে নীটিতো বাগুগা শুদ্ধ্রপরচুকোনুবলেনু. ইদু মণ্ডু কডুপুলোনিকি বেল্ল্যিনট্টিতে গোণ্ডু বেনুক ভাগং মীদ নোক্কি বান্তুলু চেয়িংচণ্ডি. বিষপূরিত লক্ষণালু কনিপিংচিনট্টিতে বেণ্টনে বৈদ্যুডিনি সংপ্রদিংচণ্ডি.

ঔষধ চিকিত্স : প্রমাদ লক্ষণান্নিবট্টি ঔষধং ইন্বালি.

জাগ্রত্তুলু : পিল্ললকু, আহার পদার্থমুলু ঊণ্ডে চোঁটুকু মরিযু পশুগ্রাসং ঊণ্ডে চোঁটুকু দুরংগা ঊংচণ্ডি.

নিল্ব্ব চেয়ুট : বেরু গদুললো লেদা আহার পদার্থমুলু ঊণ্ডে চোঁটুকু মরিযু পশুগ্রাসং ঊণ্ডেচোঁটুকু দুরংগাসু লেদা মরেদ্রেন চোঁটুনংদু লেদা ইদু পরিমাণং, তত্ত্বান্নি বট্টি ঊরে অলমারলো কীটকনাশিনি গল প্ল্যাস্টেল্‌লনু ঊংচি নিল্ব্ব চেয়ুবচ্চু. নিল্ব্ব চেয়ুটকু ঊদ্দেশিংচিন গদুলু, প্রাংগণালু অবসরমৈনংত এত্তু, পোদবু, বেডল্যু কলিগি ঊংদালি. পোঁডিগা ঊংডি কালুপ্ল্যান্নি (আবিরিনি বেল্ল্যুটনু) নিবারিংচেঁদুকু বীলুগা বেলুতুরু, গলিঅচ্চে বিধংগা নির্ম্মুংচবড বলেনু.

খালী ডব্বাল নির্ম্মুলন : নিবাস প্রাংতালকু দুরংগা খালী ডব্বালনু পগল গোট্টি পাতিপেট্টুবলেনু. ঊপয়োগিংচবডিন খালীডব্বালনু মট্টী ঊপয়োগিংচকুণ্ডা নিবারিংচেঁদুকু বাটিনি বেলুপল পেট্টুরাদু. পর্ত্যাবরণ পরিক্ষুণকু লেদা জল কালুপ্ল্যান্নি নিবারিংচেঁদুকু ডব্ব্যুলনু লেদা ব্ব্যুর্থ পদার্থালনু নির্ম্মুলিংচটকু ঊপকরণমুলকু শুদ্ধ্রপরুচটনু সুরক্ষিতমৈন পদ্ধতিলো নির্ম্মুলিংচবলেনু.

বারংটী : ঊত্পত্তিনি ঊপয়োগিংচটং মা অদুপুলো লেনংদুবল্ল, ঊত্পত্তি নান্ব্যতকু মিনহাঁমৈন দেঁনিকি ব্ব্যুত্থ স্থিকরিংচলেমু.

Etheban

ETHEPHON 39% S.L.

ईथीबान

इथेफोन ३९% एस.एल.

ইথিবান

ইথেফোন ৩৯% ঝ.খ.

উদ্ভিদ বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক

ଇଥିବାନ

ଏଥଫୋନ୍ 39% S.L.

ନିମ୍ନଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ

CAUTION : NOT TO BE USED ON CROPS OTHER THAN SPECIFIED ON THIS LABEL/LEAFLET

Manufactured By:

Vedic Agro Science Pvt. Ltd.

(An ISO 9001 : 2015 & 14001 : 2015 Certified Company)

40, Strand Road, 5th Floor, Room No. 26

Kolkata - 700 001, West Bengal

Helpline : 033 2262 2441

E-mail : vedic@vedicagro.com

Manufacturer Premises:

Vill. Baligori, P.O. Baligori,

P.S.: Tarakeswar, Dist.: Hooghly

West Bengal, Pin.: 712 410

For any complaints contact customer service Executive.

Vedic Agro Science Pvt. Ltd.

Corp. Off : 40, Strand Road, 5th Floor, Room No. 26

Kolkata - 700 001, West Bengal

Helpline : 033 2262 2441

Email : vedic@vedicagro.com