MANCOZEB 75 % WP (CONTACT FUNGICIDE)

Caution : Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet.

It is a Co-ordination product of Zinc & Manganese ethylene bisdithiocarbamate and contact fungicide based on Mancozeb Tech, containing 75% w/w active ingredient and balance adjuvants.

Recommendation :

Crop (S)	Common name of pest	Dosage/HA. A.I. (kg)	formulation (kg)	Dilution in water (Ltr)	Waiting period between last spray to harvest (in days)
Grapes	Angular leaf spot, Downy mildew, Anthracnose	1.125-1.5	1.5-2	750	-
Guava	Fruit rot	15 gm	20 gm	10	-
Potato	Late blight, Early blight	1.125-1.5	1.5-2	750	-
Banana	Tip rot, Sigatoka leaf spot, Cigarend rot	1.125-1.5	1.5-2	750	-
Wheat	Brown & Black rust, Blight	1.125-1.5	1.5-2	750	-
Cumin	Blight	1.125-1.5	1.5-2	750	-
Jowar	Leaf spot	1.125-1.5	1.5-2	750	-
Tomato	Late blight, Buck eye rot, Leaf spot	1.125-1.5	1.5-2	750	-
Paddy	Blast	1.125-1.5	1.5-2	750	-
Cauliflower	Collar rot	2.25	3	1000	-
	Leaf spot	1.125-1.5	1.5-2	750	-
Maize	Leaf blight, Downy mildew	1.125-1.5	1.5-2	750	-
Chillies	Damping off	2.25	3	1000	-
	Fruit rot	1.125-1.5	1.5-2	750	-
	Ripe rot	1.125-1.5	1.5-2	750	-
	Leaf spot	1.125-1.5	1.5-2	750	-
Groundnut	Tikka diseas & Rust	1.125-1.5	1.5-2	750	-
	Collar rot, leaf spot	18.75 to 22.50 gm / 10 kg seed	25-30 gm / 10kg seed	0.1 (water slurry)	
Apple	Scab & Sooty Blotch	22.5 gm/tree	30gm/tree	10	

Direction of Use: Ground nut: to treat the seed, first make slurry with required quantity of test fungicide with 10 ml of water per 1 kg of seed and swirl it in a closed container to make uniform coating on the seeds. Then shade dry and sown.

Time of Application: Mainly foliar spray and also soil drench, Knapsack sprayer, foot sprayer, compression knapsack sprayer, compression knapsack battery sprayer, ASPEE-HIP power sprayer.

Precaution: Caution: while handling the fungicide workers and users must wear full protective clothing like long sleeved shirts, long pants, chemical resistant gloves, shoes, goggles, hat and mask.

Precautions: 1) Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals feed. 2) Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3) Avoid inhalation of the spray mist. Spray in the direction of wind. 4) Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5) Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6) Wear full protective clothing while mixing and spraying.

Symptoms of Poisoning: Itching, tightness in chest, palpitation, hypotension, Nausea, vomiting, diarrhea. Hypothermia and ataxia may occur.

First Aid: 1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomits is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaminated, Flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air.

Phytotoxicity: The product is not phytotoxic when used as per field recommendation.

Antidote: No specific antidote is known. Treat symptomatically.

Disposal of Used Container: 1. It shall be the duty of manufactures formulator and operator to dispose packages or surplus material and washings from the machine and container shall be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental and water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. Packages shall be broken and buried away from habitation.

Storage Conditions: 1. The packages containing the material shall be stored in separate rooms or premises, away from the rooms or premises used for storing other articles or should be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quality and nature of material. 2. The room or premises meant for storing the material shall be well built, dry, ventilated, well-lit and of sufficient dimensions to avoid contaminated with vapors.

Chemical Composition:

Mancozeb technical

(Based on 85% w/w a.i.)	: 88.23 % w/w
Suspending Agent : (Gum)	: 2.00 % w/w
Dispersing Agent : (Alkyl naphthyl sulphonate)	: 2.00 % w/w
Surface active agent : (Sodium Salt of alkyl aryl Sulphonate)	: 2.00 % w/w
China Clay	: 5.77 % w/w
Total	: 100.00 % w/w

मैनकोजेब 75 प्रतिशत डब्ल्यू (स्पर्शीय फफूंदीनाशक)

सावधानी : लेबल/पत्रिका पर निर्देशित फसलों के अलावा अन्य फसलों पर प्रयोग करना मना है।

यह एक जिंक, मैंगनीस इथिलीन कारबामेट का कोओरडिनेशन है। और मैन्कोजेब टैक्नीकल से बनाई गई स्पर्शीय फफूंदनाशक है जिसमें भारानुसार ७५ सक्रिय तत्व तथा अन्य सहयोगी पदार्थ है।

उपयोग :

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा स. तत्व (ग्राम)	संरचना (कि.ली)	पानी की मात्रा (लीटर)	अन्तिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिन)
अंगूर	नुकिला पत्ती का धब्बा, मृदु रोमिल आसिता रुक्ष रोग	१.१२५-१५	१.५-२	७५०	-
अमरूद	फल विगलन	१५ ग्राम	२० ग्राम	१०	-
आलू	पछेता अंगमारी, अगेता अंगमारी	१.१२५-१.५	१.५-२	७५०	-
केला	जड़ विगलन, कोढ़ वर्ण चिती, सिगाटेक विगलन	१.१२५-१.५	१.५-२	७५०	-
गेहूँ	भूरा और काला किटट	१.१२५-१.५	१.५-२	७५०	-
ज्वार	पर्ण चिती	१.१२५-१.५	१.५-२	७५०	-
टमाटर	पछेता अंगमारी, वक आँख विगलन पर्ण चिती, मृदुरोमिल आसिता	१.१२५-१.५	१.५-२	७५०	-
धान	सहस्रामारी	१.१२५-१.५	१.५-२	७५०	-
फूलगोभी	मूल स्तम्भ	१.५-२	३	१०००	-
	पर्ण चिती	१.१२५-१.५	१.५-२	७५०	-
मक्का	पत्ती का अंगमारी	१.१२५-१.५	१.५-२	७५०	-
मिर्च	मृदुरोमिल आसिता	१.१२५-१.५	१.५-२	७५०	-
	आर्द्रगलन	२.२५	३	१०००	-
	फल विगलन	१.१२५-१.५	१.५-२	७५०	-
	परिपक्वता विगलन	१.१२५-१.५	१.५-२	७५०	-
	पर्ण चिती	१.१२५-१.५	१.५-२	७५०	-
मूंगफली	टिक्का बीमारी, किट्टू	१.१२५-१.५	१.५-२	७५०	-
	मूल स्तम्भ विगलन, पर्ण चिती	१८.७५-२२.५ ग्राम प्रति १० किलो बीज	२५.२० ग्राम प्रति १० किलो बीज	०.१ (पानी घोल)	
सेब	धब्बा	२२.२ ग्राम/पेड़	३० ग्राम/पेड़	१०	

पृथगेत्रा का निरदेश : मूंगबलली गिरी: बीज ऊपचार, प्रति । किलोग्राम बीज 10 मिली लीटर पानी नाल पतधी ऊँली/ढबूँदी मार दवाएँ दी लोऱीदी मात्तरा नाल पहिला पउलो घोल बनाएँ अते इस नूँ बीज ऊँते इकसार क्रेटिंग देन लही इक खंद डॉबे विच ऑड्डी तरहां हिलाएँ। हिर छां हेठां धुप्पल करे अते बिजाएँ करे।

सायपरनी : चितरबलीय ऊँली/ढबूँदी मार दवाएँ दे कामिआं अते वरतउं करन वालिआं नूँ मुकमल सरीरिअक कपड़े सिक्रेवि लीमीआं बाहां वाली लंबीआं कमीज़ां, लीमीआं पैंटां, रसाएिक रिवेंधी दसताने, बूट, ऐनकां, टोप अते कनाब आदि पहिनके चाहीदे हन। 1) भुंदरा वाले पदारथां, धाली होंदे धुंदरा वाले पदारथां वे डॉबिआं अते पशूआं दे चारे तों दूर रॉवे। 2) मूँह, ऑखां अते चमड़ी दा संपरक तों बचाए। 3) स्पेऊिंग दा पतन दे नाल अंदर नाह्ड ते पदरोक करे। 4) स्पेऊिंग दे दौरान कुझ वी खाणा, पीणा अते चबाणा नहीं चाहिए। 5) स्पेऊिंग करन ते पतात्तों पूरा सुरखातमक कपड़े पहनों। 6) मिसरूत अते डिज़रवण करदिआं होइआं मुंकमल सुरीरिअक कपड़े पहिरन वे रॉवे।

ज़हिर ज़ैहलत दे लछॅड़ : अचरी होऱा, छाती विच जकड़न, पज़कड़न, अलप धलड़ प्रैशर, कधिभाउड़, ऊलटी आउंड़ा, दसत, हाइपोथरमीआं अते सरीरक ख़िआ दी तालऊरीहउड़ आदि उे मवरे हन।

आरंभक डाकटरी सहाइता : 1) जे निगल गिआ है, गले दे पिछले हिंसे विच गुदगदी करके ऊलटी करवाएँ। ऊलटी दा दूर सॉहउंड़ तॅक हिंदा क्रिआ जारी रॉवे। जेकर मतीमधेशेस रोगिआ है तां उस नूँ ऊलटी नां करवाएँ। 2) जेकर कपड़े अते चिमड़ी मलीन ठे गऐ हन तां कपड़े उतॉरद लवे अते चिमड़ी नूँ साफ़ते अते पानी दी काफ़ी मात्तरा नाल ऑड्डी तरहां दो ते साफ़रवे। 3) जेकर ऑखां प्रभाविउ हन, काफ़ी मात्तरा दे धंगे/साफ़पानी दे नाल लगा-ड़ता 10-15 मिंटां तॅक ऑड्डी तरहां साफ़करवे। 4) जे साह नाल निगलिआं दे मरीज़नूं ड़ताजा हवा विच ले जाएँ।

वाएटेटेकसीमिटी- पेऊ़डर विच ज़हिरीपन नहीं है जदों इस दा पृथेगा ज़िहे खेत दीआं सिफ़ारशां अ़ऩुसार तीउा जांदा है।

ज़हिरमार दवाएँ : इस दा केही विसेस पता नहीं लॅगिआ। रोग-लछॅड़ विगिआन अ़ऩुसार ऊपचार करे,

चिमड़ीमाल सीतो गऐ डॉबिआं दा निपटरा ;1) निमात्तवां, ऊँली/ढबूँदी मार दवाएँ दी सुरतीकरन अते ऊपरेटरां दी इह डिऊटी होऐगी कि चिमड़ीमाल कीते गऐ डॉबिआं जां वापु सार्गरीआं अते मसीनां दी सहाएँ दे सामल अते डॉबिआं निपटरा दा इक सुरॅखिअत तरीके नाल कीता जाएगा। ताकि दवाउरवरन अते पानी नूँ दुसिउ होन तों बचाएँ जा सके। 2) चिमड़ीमाल कीते गऐ डॉबिआं नूँ दुऐं दा मुड़-चिमड़ीमाल तरंन लही बापर नहीं रॉखिआ जाएगा।3) चिमड़ीमाल कीते गऐ डॉबिआं नूँ उॅखिआ जाएगा अते आबादी तों दुरु दॅखिआ जाएगा।

सटेंडेंस दीआं परिसिथीआं : 1) ऊँली/ढबूँदी मार दवाएँ वाले डॉबिआं नूँ ऱॅपरे कमरिआं जां अ़ठाउिआं विच जां दुसीआं विसेस चीज़ां दमउां लही चिमड़ीमाल कीते गऐ कमरिआं जां अ़ठाउिआं तों दुरु ऊँली/ढबूँदी मार दवाएँ दी मात्तरा अते तासीर दे आधर ऊँते डॉबिआं नूँ ऱॅपरीआं अलमारीआं विच ताल अते चाबी ताउिज रॉखिआ जाएगा। 2) ऊँली/ढबूँदी मार दवाएँ दी सटोरिंग लही कमरिआं जां अ़ठाउिआं दा मउलब हुंद ऑड्डी तरां बने हॅन, धुप्पल, रोमऩदार, हवादार अते पृथगउ आकार वाले ठेह गे।

ज़ीकठमहु

ढरठधरतजमहजरुर :

मानकोज़ेब तकनीकल (85% डबलयू/डबलयू ऐ.आएी.)	: 88.23 % w/w
सामपॉंडिंग पदारथ : (गुंदि/मज़ेब)	: 2.00 % w/w
खिंडरन वाला पदारथ; (ऐलकयीलि नापहथाईल सलफ़ोनेट)	: 2.00 % w/w
सउरी बिमगसील पदारथ;(ऐलकयीलि ऐरयीलि सलफ़ोनेट)	: 2.00 % w/w
चीन दी चिकनी मिंटी	: 5.77 % w/w
कुंल	: 100.00% w/w

ಮ್ಯಾಂಕೊಜೆಬ್ 75% ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಪಿ (ಸ್ಪರ್ಶ ಪರ್ಯಾಯ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಿನಿ)

ಹೆಚ್ಚುರಿಕೆ : ಜತಪರಿಯ ಕರಪತ್ರಮಲ್ಲಿ ಪೈಕ್ಕುನ್ನ ಬೆಳ್ಳೆಪೈನೆ ಈ ಮಂದುನು ಉಪಯೋಗಿಂಚಲೆನು. ಮಿಗತಾಪ್ಪಿಲ್ಲೆ ಉಪಯೋಗಿಂಚರಾದು.

ಮ್ಯಾಂಕೊಜೆಬ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಜಿಂಕು ಮರಿಯು ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಇಥಿಲಿಕ್ ಬೈಡಾಥಿಯೋಕಾರ್ಬಮೆಟ್ ಮೂಲಕಮುಲ ಸಮ್ಮೆಳನಂ ಗಲ 75% ಸಕ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥಂ ಕಲಿಗಿನ ಸ್ಪರ್ಶ ಪರ್ಯಾಯ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಿನಿ.

ಶಿಫಾರಸುಲು:

ಪೈರು	ಕೀಟಕ	ಮೋತಾದು / ಹೆಕ್ಟಾರುకు		ನೀಟಿಲೆ	ಚಿವರಿವಾಡಕಂ
	ಸಾಧಾರಣ ನಾಮಮು	ಸ.ವ (ಗ್ರಾ.)	ಫಾರ್ಮುಲೆಷನ್ (ದ್ರಾವಣಂ (ಗ್ರಾಮುಲ್ಲೌ)	ಪಲುವನ (ಲೀಟರ್ಲು)	ಮರಿಯು ಕೊತ ಮಧ್ಯ ವ್ಯವಧಿ ಸಮಯಮು (ರೌಜುಲಲೌ)
ದ್ರಾಕ್ಷ	ಆಕುಮಚ್ಚು, ಮಚ್ಚುಗ ತೆಗುಲು, ಪಕ್ಕಿನುತ್ತುತೆಗುಲು	1.25-1.5	1.5-2	750	
ಜಾಮ	కాయకుళ్ళు	15ಗ್ರಾ	20ಗ್ರಾ	10	
ಬಂಗಾళ ದುంప	ఎండుతెగులు	1.25-1.5	1.5-2	750	
ಅರಟಿ	సిగటొక ఆకుమచ్చు మొయ్యుకుళ్ళు,	1.25-1.5	1.5-2	750	
ಗೆಡುಮ	తుప్పుతెగులు	1.25	1.5	750	
	ఎండుతెగులు	-1.5	-2		
ಜೊಲಕ್ರಲ	ఎండుతెగులు	1.25-1.5	1.5-2	750	
ಜೊನ್ನ	ఆకుమచ్చు	1.25-1.5	1.5-2	750	
ಟಮಾట	ఎండుతెగులు	1.25-1.5	1.5-2	750	
	నల్ల మచ్చు, ఆకుమచ్చు				
ವರಿ	అగ్గితెగులు	1.25-1.5	1.5-2	750	
ಪುವ్వు-	మొదలుకుళ్ళు	2.25	3	1000	
గోబి	ఆకుమచ్చు	1.25-1.5	1.5-2	750	
మొక్క-జొన్న	ఆకుఎండు	1.25-1.5	1.5-2	750	
	మచ్చుతెగులు				
మిరప	నారుకుళ్ళు	2.25	3	1000	
	కాయకుళ్ళు	1.25-1.5	1.5-2	750	
	మిరపకుళ్ళు	1.25-1.5	1.5-2	750	
	ఆకుమచ్చు	1.25-1.5	1.5-2	750	
వేరు	టిక్కామచ్చు,	1.25-1.5	1.5-2	750	
శనగ	తుప్పుతెగులు	1.25-1.5	1.5-2	750	
	మొదలుకుళ్ళు	18.75 (గ్రా/10కి. విత్తలు	25 (గ్రా./10కి. విత్తలు	0.1 (వాటర్ స్లైరీ)	
అపిల్	స్కాబ్ మచ్చు, సూదిఛ్చుడ్	22.5(గ్రా/ చెట్టు	30(గ్రా/ చెట్టు	10	

సూచనలు: వేరుశనగ: విత్తనశుద్ధికి 10 మి.లీ. ప్రమాణం 1 కి.గ్రా. విత్తనములో కలిపి బాగా అంబేలా జాగ్రత్త పడాలి. తడుపని నీడలో ఆరబెట్టి విత్తుకొనవలెను.

ఉపయోగించు సమయం : పైరు ఆకులపై పిచికారీ మరియు నేలను తడుపుటకు అనుకూలం. యంత్రకపరికరములైన నాపిసాక్ స్ప్రేయరు, పుట్‌స్ప్రేయరు, కంప్రెషన్ నాప్సాక్, బ్యాటరీస్ప్రేయరు ఆస్పీ-హెచ్‌టిపి స్ప్రేయర్లు ఉపయోగించగలము.

ముందు జాగ్రత్తలు : హెచ్చరిక : గర్భతులైన స్త్రీలు కార్బంధజైమ్ ప్రావణమునకు దూరముగా సురక్షిత ప్రదేశంలో మందును తగులనీయకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకొనవలెను. దీన్ని జల్లుకునేటప్పుడు మరియు ముఖ్యంగా జల్లేవారు పూర్తి రక్షిత దుస్తులైన పొడవాటి చేతుల చొక్క, పంట్లూం, కెమికల్‌కు తట్టుకోగల చేతితొడుగులు, కాళ్లకు బూట్లు, కళ్ళకు నల్ల కళ్ళద్దాలు, తలకు టోపి మరియు ముఖానికి కప్పులాంటివి ధరించాలి.

ముందు జాగ్రత్తలు : 1) ఆహార పదార్థాలు, ఖాళీ పాత్రలు మరియు పశు గ్రాసములు నుండి దూరముగా ఉంచండి. 2) ముఖము, కళ్ళు మరియు చర్మమునకు అంటనీయరాదు. 3) మందు ప్రావణమునకు పీల్చ రాదు. గాలి వాటముగానే పిచికారి చేయండి. 4) కలుషిత దుస్తులు మరియు కరిరోగములను శుభ్రపరుచుకోనవలెను. 5) పిచికారి చేయునపుడు పొగ త్రాగుట, త్రాగుట, తినుట మరియు ఏదైన నములుట వంటివి చేయరాదు. 6) పిచికారి చేయునపుడు మరియు మందు కలుపునపుడు సంరక్షితమైన దుస్తులను ధరించవలెను.

విషలక్షణములు : దురద, ఛాతి పట్టినిపట్టుండటం, గుండెదడ, ఇడ్లిప్రెషర్ తగ్గిపోవడం, వికారము, వాంతులవడం, అతిసారము, వొళ్ళు చల్లబడటం, అవయవాలు కదిలికలో సమన్వయత కోల్పోవడం మొదలగునవి సంభవించవచ్చు.

ప్రథమ చికిత్స : 1. రోగికి వాంతులు చేస్తూలా చేయకండి. 2. చర్మానికి, బట్టులకి అంటుకున్నట్లయితే, అంటుకున చర్మాని, బట్టలు వాలా నీటితో మరియు సబ్బుతో కడగాలి. 3. కళ్ళలో పడితే కళ్ళను సెలైన్ / శుభ్రమైన నీటితో 10 నుండి 15 నిమిషాల పాటు కడగాలి. 4. ప్రాంగిసక్లయితే, రోగిని స్వచ్ఛమైన గాలిలోకి తీసుకెళ్ళాలి.

విషత్వం: సూచింపబడిన మోతాదులో వుపయోగించిన పోసికరం కాదు.

విరుగుడు: ప్రత్యేకమైనవి ఏమీయులేదు. రోగి లక్షణములను బట్టి చికిత్స చేయండి. ఆంటి హిస్టామైన్లు లేదా స్టెరాయిడ్‌లీం అలర్జీ నుండి ఉపశమనమునకు ఇవ్వండి.

ఖాళీ డబ్బాలను పారవేయుట : 1. ఖాళీ డబ్బాలను, మిగిలిపోయిన మందు, మరియు పరికరాలు కడుగగ వచ్చిన నీటిని కడు జాగ్రత్త పమాన్తు అంటే పరిసరాలు, నీరు, నీటివనరులు కలుషితం కాకుండా కాపాడుకుంటూ పారవేసుకోవాలి. 2. ఖాళీ డబ్బాలను తిరిగి ఏ విధంగానూ వాడరాదు గనుక వాటిని బయట లభ్యత లేకుండా చేయాలియరాదు. 3. ఖాళీ డబ్బాలను పగులకొట్టి మనుష్యసంచారానికి దూరంగా పాతిపెట్టాలి.

మందు నిల్వ : 1. కీటకనాశకములు కలిగి ఉన్న పేకెజీలను విడిగదులు లేదా ప్రదేశాలలో, నిలవ చేయండి ఇతర పదార్థాలను నిలవ చేయడానికి వాడే గదులు ప్రదేశాలకు దూరంగా లేదా కీటకనాశనం పరిమాణం మరియు సన్నభావంపై ఆధారపడి విడి అల్మారాలలో తాళంచేసి నిలవ చేయవలెను. 2. కీటకనాశకములను నిలవ చేయడానికి నిర్దేశించబడిన గదులు లేదా ప్రదేశాలు చక్కగ కట్టబడి, మంచి వెలుతురు, పొడిగా, మంచి గాలి ప్రసరణతో నీటి అవిర్భతో కలుషితం అవకుండా ఉండటానికి తగినంత కొలతలు కలిగి ఉండవలెను.

రసాయన మిశ్రమం:

మ్యాంకోజెబ్ టెక్నికల్ (85% భా/భా స.వ. స్వచ్ఛత)	88.23%భా/భా
సస్పెండింగ్ ఏజెంట్ (గమ్)	2.00%భా/భా
డిస్పెర్సింగ్ ఏజెంట్ (ఆల్కిల్ నాఫ్థిలసల్ఫోనేట్)	2.00%భా/భా
సర్ఫాక్ ఆక్టివ్ ఏజెంట్ (సోడియం సాల్ట్ ఆఫ్ ఆల్కిల్ అరిల్ సల్ఫోనేట్)	2.00%భా/భా
చైనా క్లే	5.77%భా/భా
మొత్తం	100.00%భా/భా

Kaka M-45

MANCOZEB 75 % WP (CONTACT FUNGICIDE)

మైకోజెబ్ 75 ప్రతిశత డబ్ల్యూ (స్పర్శీయ ఫఫూందీనాశక)

काका एम्-45

ఫాంకోజెబ్ 75% డబ్లయు.పి సంపర్క ఔలీ/ఢబ్బుదీ మార దవాయి

কাকা এম-45

মানকোজেব্ ৭৫% ডব্লুপি (কণ্ডাক্ট ফুঙ্গিসাইড্)

Manufactured By:

Vedic Agro Science Pvt. Ltd.

(An ISO 9001 : 2015 & 14001 : 2015 Certified Company)

40, Strand Road, 5th Floor, Room No. 26

Kolkata - 700 001, West Bengal

Helpline : 033 2262 2441

E-mail : vedic@vedicagro.com

Manufacturer Premises:

Vill. Baligori, P.O. Baligori,

P.S.: Tarakeswar, Dist.: Hooghly

West Bengal, Pin.: 712 410

CAUTION : NOT TO BE USED ON CROPS OTHER THAN SPECIFIED ON THIS LABEL/LEAFLET

For any complaints contact customer service Executive.

Vedic Agro Science Pvt. Ltd.

Corp. Off : 40, Strand Road, 5th Floor, Room No. 26

Kolkata - 700 001, West Bengal

Helpline : 033 2262 2441

Email : vedic@vedicagro.com