Pyrazosulfuron Ethyl 10% WP
(Systemic Herbicide)

Pyrazosulfuron ethyl [ethyl-5-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl-carbamoyl sulfamoyl)-1-methylpyrazole-4-carboxylate] is a selective, systemic and pre emergence herbicide which effectively controls the various weeds of transplanted rice.

Recommendation:

Crop(s)	Common name of pest	A.I. (Kg)	Dosage/HA Formulation (kg)	Dilution in water (Ltr)	Waiting period in days from last spray to harvest (days)
transplanted rice.	Cyperus iria, Cyperus difformis, fimbristylis miliacea, Ludwigia parviflora, monochoria vaginalis	0.01-0.015	0.1-0.15	500-600	95

Direction of Use :
Method of application: As per the recommendation, m ix the pesticide and water at right dosage and spray. Spray by using high volume sprayer, viz. Knapsack sprayer fitted with herbicide nozzel. Use 500 to 600 litres of water per hectare. Before spraying the pesticide, it's suspension should be mixed thoroughly with a wooden log.

Time of application: Spray should be given, before emergence of weeds, at three to seven days after transplanting of rice.

Precautions : Do not mix with bare hands . Use a wooden stick for stirring during preparation of spray mixtures. Avoid breathing concentrate or spray mist. Avoid skin contact, keep away from foodstuff and animal feed. Use protective clothings such as full trouser, full sleeve shirt, cap, boots, goggles, hand gloves, apron and face shield. Do not chew, eat, drink or smoke during application. Wash hands with soap and water, after use. Change the contaminated clothes. Destroy empty containers after use.

First Aid: Remove the patient to the fresh air. Wash contaminated skin with plenty of soap and water. Remove contaminated clothes. If eyes are contaminated, flush eyes thoroughly with water for atleast 15 minutes and refer to doctor. In case of poisoning by ingestion, victim should be induced to vomit by giving tablespoon of salt in warm water. Repeat till vomit fluid is clear. If necessary, give gastric lavage with 5% sodium bicarbonate solution. In emergency take the patient to the nearest hospital.

Symptoms of poisoning : Respiratory distress, abnormal movement, convulsion may occur. Eye contact may initially cause eye irritation with discomfort, tearing or blurring of vision. Repeated dermal exposures may lead to skin irritation with discomfort or rash.

Antidote : No specific antidote. Treat symptomatically and supportively.

Disposal Of Used Container: 1. The packages or surplus materials and washing from the machines and containers should be disposed off In a safe manner so as to prevent environmental or water pollution.2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. The packages should be broken and buried away from habitation or source of water.

Storage Conditions : 1. The packages containing the herbicides shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly articles of food or shall be kept in separate almirahs under lock and key, depending on the quantity and nature of the insecticide. 2. The rooms or premises meant for storing the insecticide shall be well built, dry, well lit and ventilated and of sufficient dimensions.

Chemical Composition :

Pyrazosulfuron ethyl technical (Purity 97%)	10.309% min.
Sodium salt of Lignosulphonic acid): Wetting Agent	2.000% max.
(Aryl sulphonic acid formaldehyde condensate) - Dispersing agent	5.000% max.
(Welson-S)-Inert filler	82.691% max.
Total	**100.00% w/w**

Caution : Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet.

ಪೈರಜೋಸಲ್ಫುರಾನ್ ಇಥೈಲ್ 10% ಡಬ್ಲ್ಯುಪಿ
(ಸಿಸ್ಟಮೀಕ್ ಹೇರ್ಬಿಸೈಡ್)

ಪೈರಜೋಸಲ್ಫುರಾನ್ ಇಥೈಲ್ (ಇಥೈಲ್-5- (4,6-ಡಿಮಿಥಾಕ್ಸಿಪೈರಿಮಿಡಿನ್- 2-ಯಲ್- ಕಾರ್ಬಮೋಯಲ್ ಸಲ್ಫಾಮೋಯಲ್)- 1-ಮೀಥೈಲ್‌ಪೈರಜೂಲ್ -4-ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಟ್) ಆಯ್ದ, ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಿಕೆಯ ಸಸ್ಯನಾಶಕ ವಾಗಿದೆ, ಇದು ಕಸಿ ಮಾಡುವ ಆನ್ನದ ವಿವಿಧ ಕಳೆಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.

ಶಿಫಾರಸುಗಳು :

ಬೆಳೆ	ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುವ ಕೀಟಗಳು	ಹೆಕ್ಟೇರೋದಿರ ಪ್ರಮಾಣ ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕ ಫಾರ್ಮುಲೇಶನ್ ಮಿ.ಲೀ. (ಮಿ.ಲೀ.)		ನೀರು (ಲೀ.)	ಕೋನಿಯ ಸಿಂಪರಣೆ ಅದಬಳಿಕ ಕಟಾವಿಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳು)
ಅಕ್ಕಿ	ಸೈಪ್ರಸ್ ಇರಿಯಾ, ಸೈಪರಸ್ ಡಿಫೊರ್ಮಿಸ್, ಫಿಮ್‌ಬ್ರಿಸ್ಟೈಲಿಸ್ ಮಿಲಿಯಾಶಿಯ, ಮೋನೊಚೋರಿಯ ವಜಿನಲಿಸ್	0.01-0.015	0.1-0.15	500-600	95

ನಳಕೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಃ ಆಜಿ ವಿಧಾನಃ ಶಿಫಾರಸಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಮಿಶ್ರಮ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ರೇನಲ್ಲಿ ನೀರು. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿ ಸ್ಪ್ರೆ, ಸಾಪ್ಸಾಕ್ ಸಿಂಪಡಿಸುವದ ಸಸ್ಯನಾಶಕ ಸಾಧುಲ್ಲಿ ಆಳವಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಹೇಕ್ಟೆರಿಗೆ 500 ರಿಂದ 600 ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ. ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಮೊದಲು, ಅದನ್ನು ಆಮಾನತುಗಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಮರದ ಲಾಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು.

ಆರ್ಜಿಯ ಸಮಯಃ ಕಳೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುವ ಮೊದಲು, ಅಕ್ಕಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ನಂತರ ವಿಳು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಸ್ಪ್ರೆ ನೀಡಬೇಕು.

ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಗಳು: ಖಾಲಿ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಮಾಮಬೇಡಿ. ಸ್ಪ್ರೆ ಮಿಶ್ರಣಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಮಾಡುವಾಗ ಕಲಡಲು ಮರದ ಕೋಲುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ದ್ರವವನ್ನು ಅಥವಾ ಸಿಂಪಡಿಸಿದ ಮಂಜನ್ನು ಊಸಿರಾಡಬೇಡಿ. ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತಗಲದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ. ಆಹಾರವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆಹಾರದಿಂದ ದೂರವೇ ಇಡಿ. ರಕ್ಷಣಾ ಬಟ್ಟೆಗಳಾ ಷೂರ್ಣ ಪ್ಯಾಂಟ್‌ಗಳು, ಷೂರ್ಣ ಸ್ಲೀವ್ ಶರಟು, ಕ್ಯಾಪ್, ಬೂಟ್‌ಗಳು, ಕನ್ನಡಕಗಳು, ಕೈಗವಚಗಳು, ಆಪ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ಮುಖದ ಕವಚವನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ಅಗಿಯಬೇಡಿ, ತಿನ್ನಬೇಡಿ, ಕುಡಿಯುವುದು ಅಥವಾ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಬಳಕೆಯ ನಂತರ ಕೈಗಳನ್ನು ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಮಲಿನಗೊಂಡ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಿ. ಖಾಲಿ ಕಂಟೇನರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ ನಂತರ ನಾಶಮಾಡಿ.

ಆಂಟಿಡೋಟ್: ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಂಟಿಡೋಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಂತೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಃ ರೋಗಿಯನ್ನು ತಾಜಾ ಹವೆ ಬರುವಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಿರಿ. ಮಲಿನಗೊಂಡ ಚರ್ಮವನ್ನು ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ನೀರು ಬಳಸಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಮಲಿನಗೊಂಡ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕಳಚಿ. ಕಣ್ಣುಗಳು ಮಲಿನಗೊಂಡಲ್ಲಿ, ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 15 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಫ್ಲಷ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕಾಣಿ. ದೇಹದ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ವಿಷಕಾರಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಸಂತ್ರಸ್ತರನ್ನು ವಾಂತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರಚೋದಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬಿಸಿನೀರು ಕೊಡಬಹುದು. ಎಲ್ಲಾ ವಿಷ ಹೊರಗೆ ಬರುವವರೆಗೂ ವಾಂತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಲ್ಯಾವೇಜ್ ಅನ್ನು ಶೇ.5 ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ದ್ರವ. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಯನ್ನು ಸಮೀಪದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಿರಿ.

ಚಿಹ್ನೆಗಳುಃ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಶದ ಸಮಸ್ಯೆ, ಅಸಹಜ ಚಲನೆ, ಸೆಳೆತ ಊಂಟಾಗಬಹುದು. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೋದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಊರಿಯುವ ಮೂಲಕ ಅಸಹಜತೆ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಕಣ್ಣೀರು ಬರುವುದು ಅಥವಾ ದೃಶ್ಯ ಮಂಜಾಗಬಹುದು. ಪದೇ ಪದೇ ಡರ್ಮಲ್‌ಗಳಿಗೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮದ ಊರಿಯೂತವಾಗಿ ಅಪಿತಕರವೆನಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಗೀರುಗಳು ಬರಬಹುದು.

ಊಪಯೋಗಿಸಿದ ಧಾರಕಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ: 1. ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳು ಅಥವಾ ಹೇಚ್ಚುವರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಯಂತ್ರಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಕಂಟೇನರ್‌ಗಳಿಂದ ತೊಳೆಯುವುದನ್ನು ಪರಿಸರ ಅಥವಾ ಜಲಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಲು ಸುರಕ್ಷಿತ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹೊರಹಾಕಬೇಕು. 2. ಬಳಸಿದ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಮರು-ಬಳಕೆಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಹೊರಗೆ ಬಿಡುವುದಲಿ. 3. ಪ್ಯಾಕೇಜೂಗಳನ್ನು ಒಡೆದುಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ನಿವಾಸದಿಂದ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಮೂಲದಿಂದ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಬೇಕು.

ಶೀಖರಣಾ ನಿಯಮಗಳು: 1. ಸಸ್ಯನಾಶಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿದಲು ಬಳಸಲಾಗುವ ಕೊಠಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಆವರಣದಿಂದ ಇತರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಆಹಾರದ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಕೀಲಿಯಡಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಲ್ಮಾರಾಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಆವಲಂಬಿಸಿ ಕೀಟನಾಶಕ ಸ್ವರೂಪ. 2. ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಊದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಠಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಆವರಣಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಶುಷ್ಕ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲಿಟ್ ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಸಾಶಷ್ಟು ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆಃ

ಪೈರಜೋಸಲ್‌ಫ್ರಾನ್ ಇಥೈಲ್ ಟೆಕ್ನಿ. (ಶುದ್ಧತೆ 97%)	10.309% ಕನಿಷ್ಠ
ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಲ್ಯಿಗ್ನೋಸಲ್ಫೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್) : ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್	2.000% ಗರಿಷ್ಠ
(ಅರಿಲ್ ಸಲ್ಫೋನಿಕ್ ಆಸಿಮ್ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಟ್) - ಡಿಸ್ಪರ್ಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್	5.000% ಗರಿಷ್ಠ
(ವೆಲ್ಸನ್-ಎಸ್) - ಇಂಟರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಲರ್	82.691% ಗರಿಷ್ಠ
ಒಟ್ಟು	100.00% ಡಬ್ಲು/ಡಬ್ಲು

ಎಚ್ಚರಿಕೆ : ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿಯ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಇತರ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು.

ಪೈರಾಜ಼ೋಸಲ್ಫ್ಯುರಾನ್ ಈಥೈಲ ೧೦% ಘುಲನಶೀಲ ಚೂರ್ಣ
(ಅಂತ್ರಪ್ರವಾಹಿ ಖರಪತವಾರನಾಶಕ)

ಪೈರಾಜ಼ೋಸಲ್ಫ್ಯುರಾನ ಈಥೈಲ (ಈಥೈಲ-೫-(೪,೬-ಡಾಯಮಿಥಾಕ್ಸಿ ಪಾಯರಿಮಿಡಿನ-೨-ಇಲಕಾರಬಾಮೈಲ ಸಲ್ಫಾಮೈಲ)-೧-ಮಿಥಾಇಲ ಪೈರಾಜ಼ೋಲ-೪-ಕಾರಬೊವಿಲೆಟ), ಎಕ ಚುನಿಂದ, ಅನ್ತವಾಹಿ ಎವಂ ಅಗ್ರಿಮ ಉದಭವೊಪರಾನ್ತ ಕಖರಪತವಾರನಾಶಕ ಹೈ, ಜೊ ರೊಪಿತ ಧಾನ ಕೆ ಖರಪತವಾರೊಂ ಕಾ ಅಸರದಾರ ಢಂಗ ಸೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕರತಾ ಹೈ।

ಉಪಯೋಗ :

ಫಸಲ	ರೋಕಥಾಮ ವಾಲೆ ಕೀಟ	ಸಕಿಯ ತತ್ವ ಗಿ.ಲೀ.	ಮಾತ್ರಾ/ಹೇಕ್ಟರ ಫೊರ್ಮುಲೇಶನ ಗಿ.ಲೀ	ಪಾನೀ ಮೆಂ ಘೋಲ (ಲೀಟರ)	ಆಖರಿ ಛಿಡಕಾವ ಔರ ಕಟಾಈ ಕೆ ಬೀಚ ಅಂತರ (ದಿನೊಂ ಮೆಂ)
ರೊಪಿತ ಧಾನ	ಸಾಯಪರಸ ಇರಿಯಾ(ಛತರೀವಾಲಾ ಮೊಥಾ), ಸಾಯಪರಸ ಡಿಫಾರಮಿಸ (ಮಾರಫಲಾ), ಫಿಂಬ್ರಿಸಟಾಯಲಿಸ ಮಿಲಿಎಶಿಯಾ (ಗೋಗಿ), ಮೊನೊಕೊರಿಯಾ ವೆಜಿನಲಿಸ, ಲುಡವಿಗಿಯಾ ಪರವಿಫ್ಲೋರಾ (ಹ್ಯಾನಲಿ)	೦.೦೧೪-೦.೦೧೫	೦.೧-೦.೧೫	೫೦೦-೬೦೦	೯೫

उपयोग के लिए निर्देशः छिसंस्तुति अनुसार, उचित मात्रा में दवा और ानी का अच्छी तरह मिश्रण कर, उच्च आयतन वाले छिड़काव यन्त्र (नेपसैक स्प्रेयर) खरपतवार युक्त नोजल, द्वारा, छिड़काव करें। एक हेक्टर में ५०० स` ६०० लीटर पानी का उपयोग करें। किसी स्थान पर दोहरा छिड़काव न करें।

प्रयोग का सयम : खरपतवारनाशक का छिड़काव खरपतवार उदने से पहले तथा धान रोपने के बाद तीन से सात दिनों के अंदर करें।

प्रयोगकर्ताओं के लिये सावधानियाँः दवा को नंगे हाथों से न मिलायें। इसे एक लकड़ी की डंडी द्वारा मिलायें। इस खरपतवारनाशक को न ही सूंघें और न ही स्पर्श करें। इस खरपतवारनाशक को खाद्य पदार्थ तथा पशु आहार से दूर रखें। दवा को उपयोग में लाते समय टोपी, दस्ताने, जूते, चश्मा, सम्पूर्ण शरीर को ढकने वाले कपडे इत्यादि पहनें। उफयोग के समय खाना, पीना तथा धुम्रपान करना मना है। इसके उपयोग पश्वात हाथों को साबुन और पानी से धोयें। दूषित कपड़ों को बदल डालें। उपयोग पश्वात खाली डिब्बों को नष्ट कर दें।

विष के लक्षणः साँस लेने में तकलीफ, लडखडाना, ऐंठन जैसे लक्षण दिखाई दें सकते हैं। आँख के सम्पर्क में आने से आंसू आना तथा धुंधला दिखाई दे सकता है। बार बार चर्म के सम्पर्क से जलन एव ंखुजली हो सकती है।

प्राथमिक चिकित्साः रोगी को खुली हवा मे लायें। दूषित त्वचा को साबुन और पानी द्वारा अच्छी तरह से धोयें और दूषित कपड़ों को बदल डालें। आँखों में चला गया हो तो आँखों स्वच्छ पानी से १५ मिनट तक धोयें अथवा तुरन्त डॉक्टर को बुलायें। यदि विष, निगल लिया गया हो तो रोगी को नमक युक्त उष्ण पानी पिलायें और उल्टी करा कर पेट साफ करें। आवश्यकता पड़ने पर सोडियम् बाईकारबोनेट द्वारा पेट साफ करें। अगर जरुरत हो तो मरीज़ को अस्पताल ले जाएं।

विषनाशकः कोई खास विषनाशक उपलब्ध नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें।

खाली डिब्बों का निपटारा : १. खाली डिब्बों, बची हुई दवा को ध्यानपूर्वक नष्ट करें, जिससे की वातावरण या पानी का खोत दूषित हो। २. खरपतवारनाशक के उपयोग के पश्वात खाली डिब्बों को, पुनःउपयोग के लिए बाहर न छोडें। ३. खाली डिब्बे को दूबारा प्रयोग रोकने के लिये बाहर मत फेंकें।

संग्रहण की शर्तें : १.खरपतवारनाशक डिब्बों का भंडारण, अलग कमरा या जगह या ऐसी जगह जहां अन्य वस्तु भंडारण न हो अथवा ताला बन्द अलमारियों में करें। खरपतवारनाशक को खाद्य पदार्थ से दूर रखें। २. खरपतवारनाशक के भंडारण की जगह अच्छी तरह बनी हो, शीतल, शुष्क और हवादार हो तथा प्र्याप्त लम्बी व चौड़ी हो, जैसे की वाष्प द्वारा प्रदूषण होने का डर न रहे।

रासायनिक संघटन :

पाईराज़ोसल्फ्युरान ईथाईल टेक्निकल (शुद्धता ९७%)	१०.३०९% न्यू,
(लिगनोसल्फोनेट के सोडियम साल्टस) वेटिंग एजंट	२.०००% अधि.
(अरिल सल्फोनिक एसिड आफ फोरमलडिहाईड कन्डेनसेट) डिसपर्सिंग एजंट	५.०००% अधि.
(वेसलोन-एस) ईनर्ट फिलर	८२.६९१% अधि.
योग	१००.००% भार/भार

चेतावनी : इस लेबल /हस्तपत्रिका मे दी गई फसलो के अलावा अन्य कोईभी फसल पर इसका उपयोग ना करें ।

ପିରାଜସୁଲଫର୍ଫ୍ରୁ ଇଥିଲ୍ 10% ଡବ୍ଲ୍ୟୁପି
(ଅନ୍ତର୍ବ୍ୟାପକ କଲୁପନାଶକ)

ପିରାଜସୁଲଫର୍ଫ୍ରୁ ଇଥିଲ୍(ଇଥିଲ୍-5-5 (4,6-ଡି ମେଥାକ୍ସିପିରିମିଡିନ୍-2 -ୱାଏଲ୍-କାର୍ବାମୋୟିଲ୍ ସଲ୍ଫୋମୋୟିଲ୍)- 1- ମେଥିଲେପିରଜୋଲ୍-4-କାର୍ବାକ୍ସାଲେଟ୍) ଅନେଦି ଏମପିକଚୈୟବଡିନ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ମରିୟୁ ପୂର୍ବ ଅବିର୍ଭାବିଂଚିନ କଲୁପନାଶକ। ଇଦି ପ୍ରତିରୋଜ ବେରୁ କଲୁପୁ ମୋକ୍କଲନୁ ନିୟଂତ୍ରିସ୍ତୁନ୍ଦି.

ସିଫାରସ୍ସୁଲୁ :

ପଂଟ	ନିରୋଧିଂଚବଡେ କୀଟକାଲୁ	ସପ (ଗ୍ରା.)	ମୋତାଦୁ ହେକ୍ଟାରୁ ସୁତ୍ରୀକରଣଂ (ମି.ଲି.)	ନୀରୁ (ଲି)	ଚିବରି ସ୍ପ୍ରେ ନୁଂଡି କଲୁପବଲସିନ କୌତ କାଲଂ ସମୟୁଂ (ରୋଜୁଲୁ)
ବରି	ସିଫେରସ ଇରିୟା, ସିପେର୍ସ ଡିଫାର୍ମାସ୍, ଫିମ୍ବ୍ରିଲିସ୍‌ମେଲିସିୟା, ଲଡ୍ୱିଜିୟା ପ୍ରେଟ୍ଟିଫ୍ଲୋରା, ମୋନୋକୋରିୟା ଭେଜିନଲିସ୍	0.01-0.015	0.1-0.15	500-600	95

ଉପୟୋଗିଂଚୁଟକୁ ସୂଚନଲୁ: ସିଫାର୍ସୁ ପ୍ରକାରଂ କଲୁପୁମଂଦୁ ନିଟିତୋ କଲିପିନ ପିଚିକାରି ଚୈୟବଲେନୁ. ଅଧିକ ଒ତ୍ତିଡି ଗଲ ସ୍ପ୍ରେୟର୍‌ନୁ ଉପୟୋଗିଂଚି ପିଚିକାରି ଚୈୟବଲେନୁ. ଉଦା. ନାନ୍‌ସ୍ପାକ୍ ତୁପାର ୟଂତ୍ରମୁନୁ ଅମର୍ୱବଲେନୁ. ହେକ୍ଟାରୁକୁ 500-600 ଲିଟର୍ଲୁନୁ ଉପୟୋଗିଂଚବଲେନୁ. ପୁରୁଗୁମଂଦୁନୁ ଚଲ୍ଲେ ମୁଂଦୁ ଚେକ୍କତୋ ମିତ୍ରମାନ୍ନି କଲୁପବଲେନୁ.

ଉପୟୋଗିଂଚୁ ସମୟୁଂ: ବରି ନାରୁନି ନାଟିନ ତରୁବାତ 7 ରୋଜୁଲ ତର୍ୱାତ ପିଚିକାରି ଚୈୟବଲେନୁ.

ମୁଂଦୁଜାଗ୍ରତ୍ତୁଲୁ : ଖାଳି ଚେତୁଲତୋ କଲପରାଦୁ. ପିଚିକାରି ମିତ୍ରମାଲ ତୟାରିଲୋ ଚେକ୍କ କ୍ରଲୁ ଉପୟୋଗିଂଚଂଡି. ମଂଦୁ ମିତ୍ରମାନ୍ନି ୱାସନପିଲ୍ୱୁରାଦୁ.ଚର୍ମାନିକି ତଗଲକୁଂଡା ଜାଗ୍ରତ୍ତ ବହିଂଚାଲି. ଆହାରୁ ମରିୟୁ ପଶୁଗ୍ରାସାଲକୁ ଦୂରଂଗା ଉଂଚଂଡି. ପିଚିକାରି ସମୟଂଲୋ ଚେତୁଲକୁ ପୋଡଵାଟି ଚେତୁଲୁଗଲ ଚକ୍କାଲନୁ, ତଲକୁ ଟୋପିନି, କାଳ୍ଳକୁ ବୁଟ୍ଲୁ, କଂଟିକି ଅଦ୍ଦାଲୁ, ଚେତିକି ତ୊ଡୁଗୁଲୁ, ଶରୀରାନିକି ୟାପ୍ରାନ୍‌ନୁ ଧରିଂଚାଲି. ପିଚିକାରିଚୈସେଟପ୍ପୁଡୁ ତିନଡଂ, ତ୍ରାଗଡଂ, ଲେଦା ପ୊ଗତ୍ରାଗଡଂ ଚୈୟ ରାଦୁ. ଉପୟୋଗିଂଚିନ ତର୍ୱାତ ଚେତୁଲନୁ ସବ୍ବୁ ମରିୟୁ ନିଟିତୋ ଶୁଭ୍ରଂଗା କଡଗୱଲେନୁ. କଲୁଷିତ ବଟ୍ଟଲନୁ ୱେଂଟନେ ମାର୍ଚିୱେୟଂଡି. ଉପୟୋଗିଂଚିନ ଖାଳି ଡବ୍ବାଲନୁ ନାଶନଂ ଚୈୟଂଡି.

ବିରୁଗୁଡୁ: ପ୍ରତ୍ୟେକମୈନ ବିରୁଗୁଡୁ ଏମି ଲେଦୁ. ରୋଗ ଚିହ୍ନାଲନୁ ବଟ୍ଟି ଚିକିତ୍ସ ଚୈୟବଲେନୁ.

ପ୍ରଥମ ଚିକିତ୍ସ: ରୋଗିନି ୱେଂଟନେ ତାଜା ଗାଲି ତଗିଲେଲା ଚୈୟାଲି. ସବ୍ବୁ ମରିୟୁ ନିଟିତୋ ଚର୍ମାନ୍ନି କଡଗୱଲେନୁ. କଳ୍ଳ ମିଦ ପଡିନପୈ 15 ନିମିଷାଲ ପାଟୁ ନିଟିତୋ କଳ୍ଳନୁ କଡଗାଲି ମରିୟୁ ଡାକ୍ଟରୁନୁ ସଂପ୍ରଦିଂଚଚାଲି.ଶ୍ୱାସ ତୀସୁକୋବଡଂଲୋ ଇବ୍ବଂଦୁଲୁ ଉନ୍ନପୈ , ରୋଗିକି ୱେଚ୍ଚୁନି ନିଟିଲୋ ଉପ୍ପୁନୁ ଒କ ସ୍ପୁନୁ ୱେସି ଆ ନିଟିତୋ ୱାଂତି ଚୈୟଂଚାଲି. ମରଲ ମରଲ ୱାଂତୁଲୁ ଅୟ୍ୟେଲା ଚୈୟାଲି. ଅୱସରମୈନପୈ 5% ସୋଡିୟଂ ବାଇକାର୍ବୋନେଟ୍ ଦ୍ରାବଣଂତୋ ଗ୍ୟାସ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲାବେଜ୍ ଇୱ୍ୱାଲି. ଅତ୍ୟୱସର ପରିସ୍ଥିତିଲୋ ରୋଗିନି ସମିପଂଲୋନି ଆସୁପତ୍ରିକି ତୀସୁକେଳ୍ଳାଲି.

ଲକ୍ଷଣାଲୁ: ଶ୍ୱାସପିଲ୍ୱଡଲୋଅସୌକର୍ୟଂ, ସାଧାରଣ ସ୍ଥିତିଲୋ ଲେକପୋୟୁଟ, ମୁର୍ଚ୍ଚଲୁ ସଂଭବିଂଚବଚ୍ଚୁ. ଅସୌକର୍ୟଂ, ଦୃଷ୍ଟିଲୋପଂ ଉଂଡୱଚ୍ଚୁ. ଚର୍ମଂମିଦ ଦୁରଦ, ଦଦ୍ଦୁର୍ଲୁ, ଚିକାକୁ ସଂଭବିଂଚବଚ୍ଚୁ.

ୱାଡିନ ଡବ୍ବାଲନୁ ନାଶନଂ ଚେସିନ ବିଧାନମୁ: ୱାଡିନ ଖାଳି ଡବ୍ବାଲନୁ ବିଚ୍ଚିନ୍ନଂ ଚେସି ନିୱାସାଲକୁ ଦୂରଂଗା ଖନନଂ ଚୈୟାଲି. ଉପୟୋଗିଂଚିନ ପ୍ୟାକେଜିଲନୁ ତିରିଗି ଉପୟୋଗିଂଚକୁଂଡା ନିରୋଧିଂଚଡାନିକି ବୟଟ ପଡୱେୟରାଦୁ. ପର୍ୟାୱରଣଂ ଲେଦା ନିଟି କଲୁଷ୍ୟଂ ନିରୋଧିଂଚଡାନିକି ଖାଳି ପ୍ୟାକେଜିଲୁ ଲେଦା ମିଗୁଲୁ ପଦାର୍ଥାଲୁ ସୁରକ୍ଷିତଂଗା ନାଶନଂ ଚୈୟବଲେନୁ.

ନିଲ୍ୱ ନିବଂଧନଲୁ: 1. ପୁରୁଗୁଲ ମଂଦୁଲ ପ୍ୟାକେଟ୍ଲୁ ଉନ୍ନ ଡବ୍ବାଲନୁ ଒ରିଜନଲ୍ ଡବ୍ବାଲଲୋ ୱେରୈଗଦିଲୋ ଗାନି ଲେଦା ୱେରୈ ପ୍ରଦେଶଂଲୋ ଗାନି ଭଦ୍ରପରଚବଲେନୁ. ଆହାରପଦାର୍ଥାଲୁ ନିଲ୍ୱଚେସି ଗଦିଲୋ ୱାଟିନି ଉଂଚରାଦୁ. 2. କ୍ରିମିସଂହାରକାଲନୁ ନିଲ୍ୱଚୈୟଡାନିକି ଉଦ୍ଦେଶିଂଚିନ ଗଦୁଲୁ ଲେଦା ପ୍ରାଂଗଣଂଲୋ ବାଗା ୱେଲୁତୁରୁ, ଗାଲି ୱଚ୍ଚୈୱିଧଂଗା ଉଂଡାଲି.

ରସାୟନିକ ମିଶ୍ରମୁ :

ପିରାଜାସୁଲଫର୍ଫ୍ରୁ ଇଥିଲ୍ ଟେକ୍ନିକଲ୍ (97% ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଧାରଂଗା)	10.309% କନିଷ୍ଠ.
ଲିଗ୍ନୋସଲ୍ଫୋନିକ୍ ଅମ୍ଳର ଯୋକ୍ସ ସୋଡିୟଂ ଉପ୍ପୁ) ୱେଟ୍ଟିଂଗ୍ ଏଜେଂଟ୍	2.000% ଗରିଷ୍ଠ
(ଅରିଲ୍ ସଲ୍ଫୋନିକ୍ ଯାସିଡ୍ ଫାର୍ମଲ୍ଡିହାଇଡ୍ କାଂଡେନ୍ସିୟେଟ୍) ଡିସ୍ପର୍ସିଂଗ୍ ଏଜେଂଟ୍	5.000% ଗରିଷ୍ଠ
(ୱେଲ୍ସନ୍-ଏସ୍) ଇନର୍ଟ

ପିରାଜଟ ।ସୁଲଫୁରୁନ୍ ଇଥିଲ୍ 10% WP
(ସିଷ୍ଟମିକ୍ ହରବାଇସିଡ୍)

ପିରାଜଟ ।ସୁଲଫୁରୁନ୍ | ଇଥିଲ୍ [ଇଥାଇଲ୍ -5- (4,6- ଡାଇମଥେଟାକ୍ସି | ପିରମିଡିନ୍ -2-yl- କାର୍‌ବାମଟ ।ଇଲ୍ | ସଲଫାମଟ ।ଇଲ୍) -1-ମିଥାଇଲପାଇରାଜଟ ।ଲ୍ -4-କାର୍‌ବକ୍‌ସାଇଲେଟ୍] ହଉଛି ଏକ ଚୟନକର୍‌ତ୍ତା, ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଉତ୍‌ପାଦନ ହରବାଇସିଡ୍ ଯାହା ପ୍‌ରତିରୋପିତ ତାଂଡଳର ବିଭିନ୍ନ ତୃଣକୁ ପ୍‌ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ନିୟନ୍‌ତ୍ରଣ କରିଥାଏ |

ସୁପାରିଶ:

Crop(s)	Common name of pest	A.I. (Kg)	Dosage/HA Formulation (kg)	Dilution in water (Ltr)	Waiting period in days from last spray to harvest (days)
ଟ୍‌ରାନ୍‌ସପ୍‌ଲାଣ୍ଟେଡ ହଟ ।ଇଥିବା		0.01-0.015	0.1-0.15	500-600	95
ସାଇପରସ୍ ଆଇରିଆ,					
ଚାଇଳ | ସାଇପରସ୍ ଡିଫର୍‌ମିସ୍,					
fimbristylis miliacea,					
ଲୁଡଉଇଗିଆ ପାର୍‌ଭିଫ୍‌ଲୋରା,					
ମନୋଚୋରିୟା ଇଚିନୋକ୍‌ଲୋରିସ୍					

ବ୍ୟବହାରର ନିର୍‌ଦ୍ଦେଶ:

ପ୍ରୟୋଗର ପଦ୍ଧତି: ସୁପାରିଶ ଅନୁଯାୟୀ mix କୀଟନାଶକ ଏବଂ ଜଳକୁ ସଠିକ୍ ମାତ୍‌ରାରେ ଏବଂ ସ୍‌ପ୍‌ରେରେ ମିଶାନ୍‌ତୁ | ଉତ୍‌ତ ଭଲୟୁମ୍ ସ୍‌ପ୍‌ରେରେ ବ୍ୟବହାର କରି ସ୍‌ପ୍‌ରେ କରନ୍‌ତୁ | ହର୍‌ବାସିଡ ନ ।ଇଲେ ସହିତ ନ୍ୟାପସାକ୍ ସ୍‌ପ୍‌ରେରେ | ହକ୍‌ଟେର ପ୍‌ରତି 500 ରୁ 600 ଲିଟର ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରନ୍‌ତୁ | କୀଟନାଶକ ସ୍‌ପ୍‌ରେ କରିବା ପୂର୍‌ବରୁ ଏହାର ନିଲମ୍‌ବନକୁ କାଠ ଲଗା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶ୍‌ରଣ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ |

ପ୍ରୟୋଗର ସମୟ: ଚାଉଳ ପ୍‌ରତିରୋପଣର ତିନିରୁ ସାତ ଦିନରେ ତୃଣକ ଉତ୍‌ପନ୍ନ ହବା ପୂର୍‌ବରୁ ସ୍‌ପ୍‌ରେ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍ |

ସତର୍‌କତା: ଖାଲି ହାତରେ ମିଶାନ୍‌ତୁ ନାହିଁ | ସ୍‌ପ୍‌ରେ ମିଶ୍‌ରଣ ପ୍‌ରସ୍‌ତୁତି ସମୟରେ ଘାଣ୍‌ଟିବା ପାଇଁ ଏକ କାଠ ବାଡି ବ୍ୟବହାର କରନ୍‌ତୁ | ଶ୍ hing ।ସର୍‌ପ୍ରୟୋଗ ଏକାଗ୍‌ରତା କିମ୍‌ବା ସ୍‌ପ୍‌ରେର କୁହୁଡିରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍‌ତୁ | ଚର୍‌ମ ସମ୍‌ପ୍‌ରକାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍‌ତୁ, ଖାଦ୍‌ୟ ସାମଗ୍‌ରୀ ଏବଂ ପଶୁ ଖାଦ୍‌ୟରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍‌ତୁ | ଫୁଲ୍ ଟ୍‌ରାଉଜର, ଫୁଲ୍ ସ୍‌ଲିଭ୍ ସାର୍‌ଟ, କ୍ୟାପ୍, ବୁଟ୍, ଗଗଲ୍, ହ୍ୟାଣ୍‌ଡ୍ ଗ୍‌ଲଭ ।ଭସ୍, ଆପ୍‌ରନ୍ ଏବଂ ଫଟ୍‌ସ୍ ।ଥd ।ଭ୍ ଭଳି ପ୍‌ରତିରକ୍ଷା କପଡା ବ୍ୟବହାର କରନ୍‌ତୁ | ପ୍ରୟୋଗ ସମୟରେ ତେ ।ବାଇବା, ଖାଇବା, ପିଇବା କିମ୍‌ବା ଧୂମପାନ କରନ୍‌ତୁ ନାହିଁ | ବ୍ୟବହାର ପରେ ସାବୁନ ଏବଂ ପାଣିରେ ହାତ ଧୋଇ ଦିଅନ୍‌ତୁ | ଦୂଷିତ ପୋଷାକ ପରିବର୍‌ତ୍ତନ କରନ୍‌ତୁ | ବ୍ୟବହାର ପରେ ଖାଲି ପାତ୍‌ରଗୁଡିକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍‌ତୁ |

ପ୍ରଥମ ସହାୟତା: ଚର୍‌ମ ।ରୋଗୁ ସତେଜ ପବନକୁ ବାହାର କର | ଦୂଷିତ ଚର୍‌ମକୁ ପ୍‌ରଚୁର ସାବୁନ ଏବଂ ପାଣିରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍‌ତୁ | ଦୂଷିତ ପୋଷାକ ବା ଚୋଖକୁ ଦିଅ | ଯଦି ଆଖି ଦୂଷିତ ହୁଏ, ତବେ ଆଖିକୁ 15 ମିନିଟ୍ ପର୍‌ଯ୍ୟନ୍‌ତ ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ ush ।ଳନ୍‌ତୁ ଏବଂ ଡାକ୍‌ତରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍‌ତୁ | ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ବିଷାକ୍‌ତ ହଲେ ପୀଡିତାଙ୍କୁ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଏକ ଚାମଚ ଲୁଣ ଦଲେ ବାନ୍‌ତି କରିବାକୁ ପ୍‌ରରେରିତ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ | ବାନ୍‌ତି ତଳକ ହବା ପର୍‌ଯ୍ୟନ୍‌ତ ପୁନରାବୃତ୍‌ତି କରନ୍‌ତୁ | ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ,% ସତ ।ଡିୟମ୍ ବାଇକାର୍‌ବନେଟ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ସହିତ ଗ୍ଲାଷ୍‌ଟ୍‌ରିଜ୍ ଲାଭରେ ଦିଅନ୍‌ତୁ | ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍‌ଥିତିରେ ଚର୍‌ମ ।ରୋଗୁ ନିକଟସ୍‌ଥ ଡାକ୍‌ତରଖାନାକୁ ନିଅନ୍‌ତୁ |

ବିଷାକ୍‌ତତାର ଲକ୍‌ଷଣ: ଶ୍ୱାସସଜ୍‌ରିୟାରେ ଅସୁବିଧା, ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଗତିବିଧି, ଗଣ୍‌ଡଗୋଳ ହଟ ।ଇପାରେ | ଆଖି ଯେ ।ଗାଯାଏ ।ଗ ପ୍‌ରାଣମ୍‌ଭରେ ଅସ୍‌ୱାଭାବିକତା, ଛିଣ୍‌ଡିବା କିମ୍‌ବା ଦୃଷ୍‌ଟିର ଅସ୍‌ପଷ୍‌ଟତା ସହିତ ଆଖିରେ ଉତ୍‌ତେଜନା ସୃଷ୍‌ଟି କରିପାରେ | ବାରମ୍‌ବାର ତର୍‌ମାଲ ଏକ୍‌ସପୋଜର ଦ୍ dis ।ରା ଅସ୍‌ୱାଭାବିକତା କିମ୍‌ବା ଦୃଷ୍‌ଟା ସହିତ ଚର୍‌ମ କ୍ .ର ହଟ ।ଇପାରେ |

ପ୍ରତିକାର: ନା ନିର୍‌ଦ୍ଦିଷ୍‌ଟ ପ୍ରତିକାର ଲକ୍‌ଷଣଗତ ଏବଂ ସହାୟକ ଭାବରେ ଚିକିତ୍‌ସା କରନ୍‌ତୁ |

ବ୍ୟବହୃତ କଣ୍‌ଟେନରର ନିଷ୍‌କାସନ: 1. ପ୍ୟାକରେ କିମ୍‌ବା ଅତିରିକ୍‌ତ ସାମଗ୍‌ରୀ ଏବଂ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ପାତ୍‌ରରୁ ଧୋଇବା ଏକ ନିରାପଦ ଅଥାନରେ ପକାଯିବା ଉଚିତ | ପଦ୍‌ଧତି ଯେପରି ରେ ।କିବା ପାଇଁ | ପରିବେଶ କିମ୍‌ବା ଜଳ ପ୍‌ରଦୂଷଣ ସୁନ used ବ୍ୟବହାରକୁ ରେ ।କିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ୟାକଜେଗୁଡିକ ବାହାରେ ଛାଡି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ | 3. ପ୍ୟାକଜେଗୁଡିକ ଭାଙ୍‌ଗିବା ଏବଂ ବାସସ୍‌ଥାନ କିମ୍‌ବା ଜଳ ଉତ୍‌ସରୁ ଦୂରରେ ପୋତି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ |

ସଂରକ୍‌ଷଣ ସର୍‌ତ୍ତ: 1. ହରବାଇସିଡ୍ ଧାରଣ କରିଥିବା ପ୍ୟାକରେ ଗୁଡିକ ଅଲଗା ଅଲଗା କ ।ଠରାରେ କିମ୍‌ବା କ ।ଠରାରେ କିମ୍‌ବା ଅନ୍ୟାନ୍‌ୟ ଆର୍‌ତ୍ତିକିଲ୍ ବିଶଷତ food ଖାଦ୍‌ୟର ସାମଗ୍‌ରୀ ସଂରକ୍‌ଷଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ କ ।ଠରା କିମ୍‌ବା କ ।ଠରାରେ ରଖାଯିବ କିମ୍‌ବା ପରିମାଣ ଉପରେ ନିର୍‌ଭର କରି ଡାଲା ଏବଂ ଚାବି ତଳେ ଅଲଗା ଆଲମିରାରେ ରଖାଯିବ | କୀଟନାଶକର ପ୍‌ରକୃତି | 2. କୀଟନାଶକ ସଂରକ୍‌ଷଣ ପାଇଁ ଉର୍‌ଦ୍ଦିଷ୍‌ଟ କ ।ଠରା କିମ୍‌ବା ପରିସର ଭଲ ଭାବରେ ନିର୍‌ମିତ, ଶୁଖିଲା, ଭଲ ଆଲୋକିତ ଏବଂ ବାୟୁ ଚାଳିତ ଏବଂ ପର୍‌ଯ୍ୟାପ୍‌ତ ପରିମାଣର ହବେ |

ରାସାୟନିକ ରଚନା:

ପିରାଜଟ ।ସୁଲଫୁରୁନ୍ ଇଥିଲ୍ | ଯାନ୍‌ତ୍ରିକ | (ଶୁଦ୍‌ଧତା 97%)	10.309% ମିନିଟ୍
ଲିଗ୍‌ନଟ ।ସୁଲଫଟ ।ନିକ୍ ଏସିଡ୍ ର ସଟ ।ଡିୟମ୍ ।ଲୁଣ): ଓଟେଂ ଏକଣ୍ଟେଟ	2.000% ସର୍‌ବାଧିକ
(ଆରିଲ୍ ସଲଫଟ ।ନିକ୍ ଏସିଡ୍ ଫର୍‌ମାଲଡିହାଇଡ୍ କଣ୍‌ଡେନ୍‌ସେଟ୍) -	
ବିଛିନ୍‌ନକାରୀ ଏଜଣ୍ଟେଟ	5.000% ସର୍‌ବାଧିକ
(ୱେଲସନ୍-ଏସ୍) - ଭର୍‌ତ୍ତି ଫିଲର୍	82.691% ସର୍‌ବାଧିକ
ସମୁଦାୟ	100.00% w / w

ସତର୍‌କତା: ଏହି ଲେବେଲ୍ / ଲିଫଲେଟ୍ ରେ ନିର୍‌ଦ୍ଦିଷ୍‌ଟ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଫସଲରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ |

ପାୟରାଝୋଲ୍‌ଫ୍ୟୁରନ୍ ଇଥିଇଲ 10% ଡବ୍‌ଲ୍ୟୁପି
(ସିସ୍‌ଟେମିକ ହର୍ବିସାଇଡ)

ପାୟରାଝୋଲ୍‌ଫ୍ୟୁରନ୍ ଇଥିଇଲ ଇଥିଲ-(-(୪,୬-ଡାୟମେଥ୉କ୍‌ସିପିରିମିଡିନ-୨-ଥେଲ-କାର୍‌ବାମିୟଲ ସଲ୍‌ଫେମଥେଲ) -୧-ମେଥିଲପାୟରାଝୋଲ---କାର୍‌ବୋକସିଲେର୍ଟ୍ ଏକ ନିବଡକ, ପଦ୍ଧତଶୀର ଆଣି ପୂର୍ବ ଉଦୟ ହର୍ବିସାଇଡ ଆହେ ଜୋ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପିତ ତାଂଡଳାଚ୍ୟା ବିବିଧ ତଣାନା ପ୍ରଭାବୀପଣେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରତୋ.

ଶିଫାରସ:

ପୀକ(କାଁ)	ସାମାନ୍ୟ ନାବ	ଡୋସ / ଏଥେ		ପ୍ରତୀକ୍ଷା କାଳାବଧୀ
	ଶେବଟ୍‌ୟା	ଏ.ଆୟ. (କିଲୋ)	କାପଣୀସାଠୀ (କିଲୋ)	ଦିବସାତ ପାଣ୍‌ୟାଚ୍ୟା (ଏଲଟୀ)	କୀଟକର୍ଣ୍ଣୁର୍ଲା ଡ୍ରିୟୁଶନ ଫବାରଣୀତୀଲ ଟୋନ (ଦିବସ)
ପ୍ରତ୍ୟାରୋପିତ	ସାୟପରସ ଇରିଆ,	୦.୦୧-୦.୦୧୫	୦.୧-୦.୧୫	୫୦୦-୬୦୦	୧୫
	ତାଂଡ଼ଳ. ସାୟପ୍ରସ ଡିକ୍ରୀମିସ,				
	ଫିମବ୍ରିସ୍‌ଟାଲିସ ମିଲିଶିୟା,				
	ଲୁଡଉଇଗିୟା ପାର୍ଭିଫ୍‌ଲୋରା,				
	ମୋନୋଚୋରିୟା ଯୋନିଲିସ				
ପ୍ରତିସ୍ଥାପିତ	ସାଇପେରାସ ଆଇରିୟା,	୦.୦୧-୦.୦୧୫	୦.୧-୦.୧୫	୫୦୦-୬୦୦	୯୫
	ଚାଲ ସାଇପେରାସ ଡିଫର୍‌ମିସ,				
	ଫିମବ୍ରିସ୍‌ଟାଇଲିସ ମିଲିଆସିୟା,				
	ଲୁଡଉଇଗିୟା ପାରଭିଫ୍‌ଲୋରା,				
	ମନୋଚୋରିୟା ଭ୍ୟାଜାଇନାଲିସ				

ବ୍ୟବହାରର ନିର୍‌ଦ୍ଦେଶ:

ପ୍ରୟୋଗର ପଦ୍ଧତି: ସୁପାରିଶ ଅନୁସାରେ, ସଠିକ ମାତ୍ରାୟ କୀଟନାଶକ ଏବଂ ଜଳ ମିଶାଏ, ସ୍ପ୍ରେ କର୍‌ନ୍ନ | ଉଚ୍ଚ ଆୟତନର ସ୍ପ୍ରେୟାର ବ୍ୟବହାର କରେ ସ୍ପ୍ରେ କର୍‌ନ୍ନ, ଯେମନ | ନ୍ୟାପସ୍ୟାକ ସ୍ପ୍ରେୟାରେ ହର୍ବିସାଇଡ ନଜେଲ ଲାଗାନୋ | ପ୍ରତି ହେକ୍ଟରେ ୫୦୦ ଥେକେ ୬୦୦ ଲିଟାର ପାନି ବ୍ୟବହାର କର୍‌ନ୍ନ | କୀଟନାଶକ ସ୍ପ୍ରେ କରାର ଆଗେ, ଏଟିର ସାସପେନଶନ ଏକଟି କାଠର ଲଗେର ସାଥେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖଭାବେ ମିଶ୍ରିତ କରା ଉଚିତ |

ପ୍ରୟୁଗେର ସମୟ: ଧାନ ରୋପଣେର ତିନ ଥେକେ ସାତ ଦିନର ମଧ୍ୟେ ଆଗାଛା ବେର ହଓୟାର ଆଗେ ସ୍ପ୍ରେ କରତେ ହବେ |

ସତର୍‌କତା: ଖାଲି ହାତେ ମେଶାବେନ ନା | ସ୍ପ୍ରେ ମିଶ୍ରଣ ତୈରିର ସମୟ ନାଡ଼ାର ଜନ୍ୟ ଏକଟି କାଠେର ଲାଠି ବ୍ୟବହାର କର୍‌ନ୍ନ | ଶ୍ୱାସ ଘନୀଭୂତ ବା ସ୍ପ୍ରେ କୁୟାଶା ଏଡ଼ିୟେ ଚଲୁନ | ତ୍ୱକେର ସଂସ୍ପର୍ଶ ଏଡ଼ିୟେ ଚଲୁନ, ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ପଶୁଖାଦ୍ୟ ଥେକେ ଦୂରେ ଥାକୁନ | ପ୍ରତିରାମୂଳକ ପୋଶାକ ଯେମନ ଫୁଲ ଟ୍ରାଉଜାର, ଫୁଲ ହାତା ଶାର୍ଟ, କ୍ୟାପ, ବୁଟ, ଗଗଲସ, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗାଉସ, ଏପ୍ରୋନ ଏବଂ ଫେସ ଶିଲ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କର୍‌ନ୍ନ | ପ୍ରୟୁଗେର ସମୟ ଚିବାନ, ଖାଓୟା, ପାନ ବା ଧୂମପାନ କରବେନ ନା | ବ୍ୟବହାରେର ପରେ, ସାବାନ ଏବଂ ଜଳ ଦିୟେ ହାତ ଧୁୟେ ନିନ | ଦୂଷିତ ପୋଶାକ ପରିବର୍ତନ କର୍‌ନ୍ନ | ବ୍ୟବହାରେର ପରେ ଖାଲି ପାତ୍ରଗୁଲି ଧ୍ୱଂସ କର୍‌ନ୍ନ |

ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା: ରୋଗୀକେ ତାଜା ବାତାସେ ସରିୟେ ଦିନ | ପ୍ରଚୁର ସାବାନ ଏବଂ ଜଳ ଦିୟେ ଦୂଷିତ ତ୍ୱକ ଧୁୟେ ଫେଲୁନ | ଦୂଷିତ କାପଡ଼ ସରାନ | ଯଦି ଚୋଖ ଦୂଷିତ ହୟ, କମପ୍ ୧୫ ମିନିଟେର ଜନ୍ୟ ଜଳ ଦିୟେ ଚୋଖ ଭାଲଭାବେ ଧୁୟେ ଫେଲୁନ ଏବଂ ଡାକ୍ତାରେର କାଛେ ଯାନ | ଖାଓୟାର ଫଳେ ବିସକ୍ରିୟା ହଲେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କେ ଗରମ ପାନିତେ ଟେବିଲ ଚାମଚ ଲବଣ ଦିୟେ ବମି କରତେ ପ୍ରରୋଚିତ କରତେ ହବେ | ବମିର ତରଳ ପରିଷ୍କାର ନା ହଓୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁନରାବୃତ୍ତି କର୍‌ନ୍ନ | ପ୍ରୟୁଜେନେ ୫% ସୋଡିୟାମ ବାଇକାର୍ବନେଟ ଦ୍ରବଣ ଦିୟେ ଗ୍ୟାସ୍ଟ୍ରିକ ଲାଭେଜ ଦିନ | ଜର୍‌ନ୍ନି ଅବସ୍ଥାୟ ରୋଗୀକେ ନିକଟସ୍ଥ ହାସପାତାଲେ ନିୟେ ଯାନ |

ବିସକ୍ରିୟାର ଲଣ : ଶ୍ୱାସକଷ୍ଟ, ଅସ୍ୱାଭାବିକ ନଡ଼ାଚଡ଼ା, ଖିଚୁନି ହତେ ପାରେ | ଚୋଖେର ସଂସ୍ପର୍ଶେ ପ୍ରାଥମିକଭାବେ ଅସ୍ୱସ୍ତିଜ୍ ଛିଡ଼ୁ ଯାଓୟା ବା ଦୃଷ୍ଟି ଝାପସା ହୟ, ଚୋଖେର ଜ୍ୱାଳା ହତେ ପାରେ | ବାରବାର ଡାର୍ମାଲ ଏକ୍ସପୋଜାର ଅସ୍ୱସ୍ତିଡ଼ବା ଫୁସକୁଡ଼ି ସହ ତ୍ୱକେ ଜ୍ୱାଳା ହତେ ପାରେ |

ପ୍ରତିଷେଧକ: ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷେଧକ ଲକ୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ସହାୟକଭାବେ ଚିକିତ୍ସା କର୍‌ନ୍ନ |

ବ୍ୟବହୃତ ପାତ୍ରର ନିଷ୍ପତ୍ତି: ୧. ପ୍ୟାକେଜ ବା ଉଦ୍ଧୃତ୍ତ ଉପକରଣ ଏବଂ ମେଶିନ ଏବଂ ପାତ୍ରେ ଓସ୍ୱାଶିଂ ଏକଟି ନିରାପଦେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରା ଉଚିତ ପଦ୍ଧତି ଯାତେ ପ୍ରତିରୋଧ କରା ଯାୟ ପରିବେଶଗତ ବା ଜଳ ଦୂଷଣ.୨. ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ୟାକେଜଗୁଳି ତାଦେର ପୁନରାୟ ବ୍ୟବହାର ରୋଧ କରାର ଜନ୍ୟ ବାଇରେ ରାଖା ଯାବେ ନା | ୩. ପ୍ୟାକେଜଗୁଳିକେ ଭାଙ୍ଗା ଏବଂ ଆବାସଙ୍କୁଳ ବା ଜଳର ଉତ୍‌ସ ଥେକେ ଦୂରେ ପୁଁତେ ଫେଲତେ ହବେ |

ଷ୍ଟୋରେଜ ଶର୍ତ: ୧. ହାର୍ବିସାଇଡ ସମ୍ବଳିତ ପ୍ୟାକେଜଗୁଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିସପତ୍ର ବିଶେଷ କରେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସଂରଣର ଜନ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ କ ବା ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଥେକେ ଦୂରେ ଆଲାଦା କ ବା ତଚୁରେ ସଂରଣ କରା ଉଚିତ ବା ପରିମାଣେର ଉପର ନିର୍ଭର କରେ ତାଲା ଏବଂ ଚାବିର ନୀଚେ ଆଲାଦା ଆଲମାରିତେ ରାଖା ଉଚିତ | କୀଟନାଶକ ପ୍ରକୃତି | ୨. କୀଟନାଶକ ସଂରଣେର ଜନ୍ୟ ର୍‌ମ୍ମ ବା ପ୍ରାଙ୍ଗଣଗୁଳି ଭାଲଭାବେ ନିର୍ମିତ, ଶୁକନୋ, ଭାଲ ଆଲୋକିତ ଏବଂ ବାୟୁଚଳାଚଳ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାତ୍ରାର ହତେ ହବେ |

ରାସାୟନିକ ରଚନା :

ପାଇରାଜୋସାଲଫୁରନ ଇଥାଇଲ ପ୍ରଯୁକ୍ତିଗତ (ବିଶୁଦ୍ଧତା ୯୭%)	୧୦.୩୦୯% ମିନିଟ ।
ଲିଗନୋସାଲଫୋନିକ ଆସିଡର ସୋଡିୟାମ ଲବଣ: ଭେଜାନୋ ଏଜେଣ୍ଟ	୨.୦୦୦% ସର୍ବୋଚ୍ଚ
(ଆରିଲ ସାଲଫୋନିକ ଆସିଡ ଫର୍ମାଲଡିହାଇଡ କଣ୍ଡେନସେଟ) -	
ବିଚ୍ଛୁରଣକାରୀ ଏଜେଣ୍ଟ	୫.୦୦୦% ସର୍ବୋଚ୍ଚ
(ଓୟାଲେସନ-ଏସ)-ଜଡ଼ ଫିଲାର	୮୨.୬୯୧% ସର୍ବୋଚ୍ଚ
ମୋଟ	୧୦୦.୦୦% ସର୍ବୋଚ୍ଚ ।

ସତର୍‌କତା: ଏହି ଲେବେଲ/ଲିଫଲେଟେ ଉଲ୍ଲେଖ କରା ଛାଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଫସଲେ ବ୍ୟବହାର କରା ଯାବେ ନା |

ପାଇରାଜୋସାଲଫୁରନ ଇଥାଇଲ ୧୦% ଡଚ
(ସିସ୍ଟେମିକ ହର୍ବିସାଇଡ)

ପାଇରାଜୋସାଲଫୁରନ ଇଥାଇଲ [ଇଥାଇଲ-୫-(୪,୬-ଡାଇମେଥକ୍ସି ପାଇରିମିଡିନ -୨-ଇଏଲ- ପଧଦ୍‌ନଧସ୍‌ଡୁଷ ସାଲଫାମାଇଲ)-୧-ମିଥାଇଲପାଇରାଜୋଲ-୪-କାରବକ୍ସିଲେଟ] ଏକଟି ନିର୍ବାଚନୀ, ପଦ୍ଧତିଗତ ଏବଂ ପ୍ରାକ-ଆବିର୍ଭାବ ହାର୍ବିସାଇଡ ଯା କାର୍ଯକରଭାବେ ରୋପା ଧାନର ବିଭିନ୍ନ ଆଗାଛା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ |

ସୁପାରିଶ:

Crop(s)	Common name of pest	A.I. (Kg)	Dosage/HA Formulation (kg)	Dilution in water (Ltr)	Waiting period in days from last spray to harvest (days)
ପ୍ରତିସ୍ଥାପିତ	ସାଇପେରାସ ଆଇରିୟା,	୦.୦୧-୦.୦୧୫	୦.୧-୦.୧୫	୫୦୦-୬୦୦	୯୫
	ଚାଲ ସାଇପେରାସ ଡିଫର୍‌ମିସ,				
	ଫିମବ୍ରିସ୍‌ଟାଇଲିସ ମିଲିଆସିୟା,				
	ଲୁଡଉଇଗିୟା ପାରଭିଫ୍‌ଲୋରା,				
	ମନୋଚୋରିୟା ଭ୍ୟାଜାଇନାଲିସ				

ବ୍ୟବହାରର ଦିନନିର୍ଦେଶ:

ପ୍ରୟୁଗର ପଦ୍ଧତି: ସୁପାରିଶ ଅନୁସାରେ, ସଠିକ ମାତ୍ରାୟ କୀଟନାଶକ ଏବଂ ଜଳ ମିଶାଏ, ସ୍ପ୍ରେ କର୍‌ନ୍ନ | ଉଚ୍ଚ ଆୟତନର ସ୍ପ୍ରେୟାର ବ୍ୟବହାର କରେ ସ୍ପ୍ରେ କର୍‌ନ୍ନ, ଯେମନ | ନ୍ୟାପସ୍ୟାକ ସ୍ପ୍ରେୟାରେ ହାର୍ବିସାଇଡ ନଜେଲ ଲାଗାନୋ | ପ୍ରତି ହେକ୍ଟରେ ୫୦୦ ଥେକେ ୬୦୦ ଲିଟାର ପାନି ବ୍ୟବହାର କର୍‌ନ୍ନ | କୀଟନାଶକ ସ୍ପ୍ରେ କରାର ଆଗେ, ଏଟିର ସାସପେନଶନ ଏକଟି କାଠର ଲଗେର ସାଥେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖଭାବେ ମିଶ୍ରିତ କରା ଉଚିତ |

ପ୍ରୟୁଗେର ସମୟ: ଧାନ ରୋପଣେର ତିନ ଥେକେ ସାତ ଦିନର ମଧ୍ୟେ ଆଗାଛା ବେର ହଓୟାର ଆଗେ ସ୍ପ୍ରେ କରତେ ହବେ |

ସତର୍‌କତା: ଖାଲି ହାତେ ମେଶାବେନ ନା | ସ୍ପ୍ରେ ମିଶ୍ରଣ ତୈରିର ସମୟ ନାଡ଼ାର ଜନ୍ୟ ଏକଟି କାଠେର ଲାଠି ବ୍ୟବହାର କର୍‌ନ୍ନ | ଶ୍ୱାସ ଘନୀଭୂତ ବା ସ୍ପ୍ରେ କୁୟାଶା ଏଡ଼ିୟେ ଚଲୁନ | ତ୍ୱକେର ସଂସ୍ପର୍ଶ ଏଡ଼ିୟେ ଚଲୁନ, ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ପଶୁଖାଦ୍ୟ ଥେକେ ଦୂରେ ଥାକୁନ | ପ୍ରତିରାମୂଳକ ପୋଶାକ ଯେମନ ଫୁଲ ଟ୍ରାଉଜାର, ଫୁଲ ହାତା ଶାର୍ଟ, କ୍ୟାପ, ବୁଟ, ଗଗଲସ, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗାଉସ, ଏପ୍ରୋନ ଏବଂ ଫେସ ଶିଲ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କର୍‌ନ୍ନ | ପ୍ରୟୁଗେର ସମୟ ଚିବାନ, ଖାଓୟା, ପାନ ବା ଧୂମପାନ କରବେନ ନା | ବ୍ୟବହାରେର ପରେ, ସାବାନ ଏବଂ ଜଳ ଦିୟେ ହାତ ଧୁୟେ ନିନ | ଦୂଷିତ ପୋଶାକ ପରିବର୍ତନ କର୍‌ନ୍ନ | ବ୍ୟବହାରେର ପରେ ଖାଲି ପାତ୍ରଗୁଲି ଧ୍ୱଂସ କର୍‌ନ୍ନ |

ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା: ରୋଗୀକେ ତାଜା ବାତାସେ ସରିୟେ ଦିନ | ପ୍ରଚୁର ସାବାନ ଏବଂ ଜଳ ଦିୟେ ଦୂଷିତ ତ୍ୱକ ଧୁୟେ ଫେଲୁନ | ଦୂଷିତ କାପଡ଼ ସରାନ | ଯଦି ଚୋଖ ଦୂଷିତ ହୟ, କମପ୍ ୧୫ ମିନିଟେର ଜନ୍ୟ ଜଳ ଦିୟେ ଚୋଖ ଭାଲଭାବେ ଧୁୟେ ଫେଲୁନ ଏବଂ ଡାକ୍ତାରେର କାଛେ ଯାନ | ଖାଓୟାର ଫଳେ ବିସକ୍ରିୟା ହଲେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କେ ଗରମ ପାନିତେ ଟେବିଲ ଚାମଚ ଲବଣ ଦିୟେ ବମି କରତେ ପ୍ରରୋଚିତ କରତେ ହବେ | ବମିର ତରଳ ପରିଷ୍କାର ନା ହଓୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁନରାବୃତ୍ତି କର୍‌ନ୍ନ | ପ୍ରୟୁଜେନେ ୫% ସୋଡିୟାମ ବାଇକାର୍ବନେଟ ଦ୍ରବଣ ଦିୟେ ଗ୍ୟାସ୍ଟ୍ରିକ ଲାଭେଜ ଦିନ | ଜର୍‌ନ୍ନି ଅବସ୍ଥାୟ ରୋଗୀକେ ନିକଟସ୍ଥ ହାସପାତାଲେ ନିୟେ ଯାନ |

ବିସକ୍ରିୟାର ଲଣ : ଶ୍ୱାସକଷ୍ଟ, ଅସ୍ୱାଭାବିକ ନଡ଼ାଚଡ଼ା, ଖିଚୁନି ହତେ ପାରେ | ଚୋଖେର ସଂସ୍ପର୍ଶେ ପ୍ରାଥମିକଭାବେ ଅସ୍ୱସ୍ତିଜ୍ ଛିଡ଼ୁ ଯାଓୟା ବା ଦୃଷ୍ଟି ଝାପସା ହୟ, ଚୋଖେର ଜ୍ୱାଳା ହତେ ପାରେ | ବାରବାର ଡାର୍ମାଲ ଏକ୍ସପୋଜାର ଅସ୍ୱସ୍ତିଡ଼ବା ଫୁସକୁଡ଼ି ସହ ତ୍ୱକେ ଜ୍ୱାଳା ହତେ ପାରେ |

ପ୍ରତିଷେଧକ: ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷେଧକ ଲକ୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ସହାୟକଭାବେ ଚିକିତ୍ସା କର୍‌ନ୍ନ |

ବ୍ୟବହୃତ ପାତ୍ରର ନିଷ୍ପତ୍ତି: ୧. ପ୍ୟାକେଜ ବା ଉଦ୍ଧୃତ୍ତ ଉପକରଣ ଏବଂ ମେଶିନ ଏବଂ ପାତ୍ରେ ଓସ୍ୱାଶିଂ ଏକଟି ନିରାପଦେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରା ଉଚିତ ପଦ୍ଧତି ଯାତେ ପ୍ରତିରୋଧ କରା ଯାୟ ପରିବେଶଗତ ବା ଜଳ ଦୂଷଣ.୨. ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ୟାକେଜଗୁଳି ତାଦେର ପୁନରାୟ ବ୍ୟବହାର ରୋଧ କରାର ଜନ୍ୟ ବାଇରେ ରାଖା ଯାବେ ନା | ୩. ପ୍ୟାକେଜଗୁଳିକେ ଭାଙ୍ଗା ଏବଂ ଆବାସଙ୍କୁଳ ବା ଜଳର ଉତ୍‌ସ ଥେକେ ଦୂରେ ପୁଁତେ ଫେଲତେ ହବେ |

ଷ୍ଟୋରେଜ ଶର୍ତ: ୧