Validamycin 3% L systemic-Antibiotic

Validamycin 3% L is an antifungal preparation and Antibiotic comound. It has low mammalian toxicity and hence a safe Antibiotic. It is an effective Antibiotic for the control of rice sheath blight only.

Recommendation :

Crop (s)	Common Name of pest	a.i. (gm)	Dosage/Ha. Formu-lation (ml.)	Dilution in water (ltr.)	Waiting Period between last spray to harvest days
Rice	Sheath Bilght	60	2000	750	There should be no residues on grains and straw of paddy 14 days before the harvest.

Direction of Use : P.P. Equipment: Knapsack sprayer, foot sprayer, compression knapsack sprayer, compression knapsack battery and ASPEE-HTP power sprayer etc. Validamycin is compatible with most common insecticides.

Precautions :

1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals feed.
2. Avoid contact with mouth, eyes and skin.
3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind.
4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying.
5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying.
6. Wear full protective clothing while mixing and spraying.

Symptoms of Poisoning :

Headache, giddiness, nausea, vomiting and anxiety may occur.

First aid measures:

1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomit us is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious.
2. If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water.
3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes.
4. If inhaled, remove the patient to fresh air.

Phytotoxicity : Validamycin is not phytotoxic to crop at recommended doses.

Antidote : No specific antidote is known. Treat symptomatically.

Disposal of Use container :

1. It shall be the duty of manufactures formulators and operator to dispose Packages or surplus material and washing from the equipment should be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution.
2. The packages shall be broken and buried away from habitation.
3. The used packages shall be left out side to prevent their re-use.

Storage Conditions :

1. The package containing the fungicide shall be stored in separate rooms or premises, away from the room or premises used for storing other articles particularly articles of food or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of the fungicide.
2. The rooms or premises meant for storing the insecticide and shall be well built, airy, well lit and ventilated and of sufficient dimension to avoid contamination with vapour.

Chemical Composition :

Validamycin a.i	: 3.00% w/w
Polyoxy ethylene nonyl phenyl ether (NP-85)	: 2.00% w/w
Silicone-KM-72	: 0.01% w/w
Potassium sorbate	: 0.05% w/w
Acid green dye	: 0.01% w/w
Water	: Q.S.%
Total	: 100.00% w/w

वालीडामाईसिन ३प्रतिशत सांद्र अंर्तप्रवाही प्रतिजैविक

वालीडामाईसिन ३प्रतिशत सांद्र एक फफूंदनाशक तथा प्रतिजैविक संरचना हैं । स्तनधारियों के लिये इसकी विषाक्तता निम्न स्तर हैं अतः यह एक सुरक्षित प्रतिजैविक हैं।

केवल धान पर आच्छद अंगमारी रोग के नियंत्रण के लिये प्रभावकारी प्रतिजैविक है।

उपयोग :

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा स.तत्व ग्राम	संरचना (मि.ली.)	पानी की मात्राअ ि न त म (ली)	
छिड़काव					तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिन)
धान्य	आच्छद अंगमारी	६०	२०००	७५०	फसल कटाई के १४ दिनों के पहले धान के दानों व भूसी पर फफूंदी नाशक का अंश नहीं होना चाहिये।

उपयोग के लिये निर्देश : नौध सुरक्षा यंत्र :

पीठ पर लाद कर छिडकाव करने वाचा यंत्र पैर से चलाने वाला छिडकाव यंत्र, पीठ पर लाद कर दबाव से चलने वाला छिडकाव यंत्रें एस पी.डी.ई एच.टी.पी. शकि चालिये छिड़काव यंत्र आदि।

संयोज्यता : अधिकांश सामान्य प्रयोग में आने वाले कीटनाशक के साथ मिला कर प्रयोग किया जा सकता है।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां :

१. खाद्यसामग्री खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओ के चारे से दूर रखें।

२. मुंह, त्वचा और आंखों के सम्पर्क से बचायें।

३. छिडकाव की वाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचायें। हवा की दिशा मे छिडकाव करें।

४. छिडकाव के बाद दूषित कपडो और शरीर के अंगो को अच्छी तरह धोएं।

५. छिडकाव के समय धूमपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए।

६. छिडकाव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपडे पहनें।

विष के लक्षण :

सिरदर्द, चक्कर आना, मितली, उल्टी, घबराहट हो सकते हैं।

प्राथमिक चिकित्सा :

१. यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी करायें यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न करायें।

२. यदि कपडे और त्वचा दूषित हो जाए तो दूषित कपड़े उतार दें और त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं।

३. यदि आंखे दूषित हो जाये तो उनको काफी मात्रा में सैलाइन/साफ पानी सें लगभग १०-१५ मिनट तक धोएं।

४. यदि सांस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें।

पौधविशाक्तता : सुझाव की मात्रा के अनुसार प्रयोग करने पर यह कीटनाशक पौधविषाक्त नहीं हैं।

विषनाशक : कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं हैं। लक्षणानुसार इलाज करें।

खाली डिब्बों का निपटारा :

१. फफूंदनाशक निर्माताओं/उपयोग कर्ता का कर्तव्य है कि डिब्बो या पात्रो को तोडफ़ोडक़र आबादी से दूर जमीन मे गाड देना चाहिए।

२. प्रयोग किये गये डिब्बो को दूबारा प्रयोग के लिये बाहर खुला छोड।

३. डिब्बो या बची हुई फफूंदनाशक या धोवन का निपटारा इस प्रकार करे कि जिससे आसपास की चीजे पीने का पानी विषैला खुला नहो।

संग्रहण की शर्ते : १. फफूंदनाशक के डिब्बों को अन्य सामग्री, विशेषकर खाने के सामान के आधार पर रखना चाहिए। २.फफूंदनाशक के संग्रहण हेतु उपयोग किये जाने वाले कमरे या इमारतें मजबूत, सूखी, भली भांति प्रकशित तथा हवादार होनी चाहिए तथा उनमें प्रप्त स्थान होना चाहिए ताकि भाप से प्रदूषण हो सके।

रासायनिक संरचना :

वालीडामाईसिन सक्रिय तत्व	: ३.००% भार/भार
पोलीऐक्सी ईथाईलीन नोनईल ईथर एन.पी. ८५	: २.००% भार/भार
सिलिकोन के.एम. ७२	: ०.०१% भार/भार
पोटाशियम सोरबेट	: ०.०५% भार/भार
एसिड हरी डाई	: ०.०१% भार/भार
पानी	: पर्याप्त मात्रा % भार/भार
योग	: १००.००% भार/भार

বভ্যালিডামাইসিন ৩% এল সিস্টেমিক-অ্যান্টিবায়োটিক

ঠেখবরফৎসুপরহ ৩% ব হল একটি অ্যান্টিফাঙ্গাল প্রস্তুতি এবং অ্যান্টিবায়োটিক যৌগ। এটিতে কম স্ড্যানাপায়ী বিষাক্ততা রয়েছে এবং তাই একটি নিরাপদ অ্যান্টিবায়োটিক। এটি শুধুমাত্র ধানের শীট বাইট নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি কার্যকর অ্যাভ্যালিডামাইসিন ৩% এল সিস্টেমিক-অ্যান্টিবায়োটিক

সুপারিশ:

Crop (s)	Common Name of pest	a.i. (gm)	Dosage/Ha. Formu-lation (ml.)	Dilution in water (ltr.)	Waiting Period between last spray to harvest days
জরপব ফসল কাটার দিন					
চালের	খাপ ইরময	৬০	০০০	৭৫০	থাকা উচিত নং হতে উপর অবশিষ্টাংশ শস্য এবং ধানের খ/ ১৪ দিন আগে ফসল

ব্যবহারের দিকনির্দেশ:

পিপি সরঞ্জাম: ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার, ফুট স্প্রেয়ার, কম্প্রেশন ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার, কম্প্রেশন ন্যাপস্যাক ব্যাটারি এবং অবচউউ-ঐএচ্চ পাওয়ার স্প্রেয়ার ইত্যাদি। ভ্যালিডামাইসিন সর্বাধিক সাধারণ কীটনাশকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

সতর্কতা: ১. খাদ্যসামগ্রী, খালি খাবারের পাত্র এবং পশুর খাদ্য থেকে দূরে রাখুন। ২. মুখ, চোখ এবং ত্বকের সাথে যোগাযোগ এড়িয়ে চলুন। ৩. স্প্রে কুয়াশা ইনহেলেশন এড়িয়ে চলুন, বাতাসের দিকে স্প্রে করুন। ৪. স্প্রে করার পওে দূষিত জামাকাপড় এবং শরীরের অংশগুলি ভালভাবে ধুয়ে ফেলুন। ৫. স্প্রে করার সময় ধূমপান করবেন না, পান করবেন না, খান এবং চিববেন না। ৬. মিশ্রণ এবং স্প্রে করার সময় সম্পূর্ণ প্রতিরামূলক পোশাক পরুন।স্টিবায়োটিক

ফাইটোটক্সিসিটি: ভ্যালিডামাইসিন সুপারিশকৃত মাত্রায় ফসলের জন্য ফাইটোটক্সিক নয়।

প্রতিষেধক: কোনো নির্দিষ্ট প্রতিষেধক জানা নেই। লণগতভাবে চিকিত্সা করুন। ব্যবহারের পাত্রের নিষ্পত্তি: ১. প্যাকেজ বা উদ্বৃত্ত উপাদান নিষ্পত্তি করা প্রস্তুতকারক এবং অপারেটরের দায়ত্বি হবে এবং সরঞ্জাম থেকে ওয়াশিং নিরাপদ উপায়ে নিষ্পত্তি করা উচিত যাতে পরিবেশ বা জল দূষণ প্রতিরোধ করা যায়। ২. প্যাকেজগুলি ভাঙ্গা এবং বাসস্থান থেকে দূরে কবর দেওয়া হবে। ৩. ব্যবহৃত প্যাকেজগুলিকে তাদের পুনঃব্যবহার রোধ করার জন্য বাইরে রেখে দিতে হবে।

বিষক্রিয়ার লণ: মাথাব্যথা, মাথা ঘোরা, বমি বমি ভাব, বমি এবং উদ্বেগ হতে পারে।

প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা: ১. গিলে ফেলা হলে, গলার পিছনে সুড়সুড়ি দিয়ে, বমি করান। আমাদের বমি পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ড় এটি পুনরাবৃত্তি করুন। রোগী অজ্ঞান হলে বমি করবেন না। ২. যদি পোশাক এবং ত্বক দূষিত হয়, কাপড় সরিয়ে, ফেলুন এবং দূষিত ত্বক প্রচুর পরিমাণে সাবান এবং জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। ৩. চোখ দূষিত হলে, প্রায় ১০ থেকে ১৫ মিনিটের জন্য প্রচুর স্যালাইন/পরিষ্কার জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। ৪. শ্বাস নেওয়া হলে, রোগীকে তাজা বাতাসে সরিয়ে দিন।

প্রতিষেধক: কোনো নির্দিষ্টপ্রতিষেধক জানা নেই। লণগতভাবে চিকিত্সা করুন।

ব্যবহারের পাত্রের নিষ্পত্তি: ১. প্যাকেজ বা উদ্বৃত্ত উপাদান নিষ্পত্তি করা প্রস্তুতকারক এবং অপারেটরের দায়ত্বি হবে এবং সরঞ্জাম থেকে ওয়াশিং নিরাপদ উপায়ে নিষ্পত্তি করা উচিত যাতে পরিবেশ বা জল দূষণ প্রতিরোধ করা যায়। ২. প্যাকেজগুলি ভাঙ্গা এবং বাসস্থান থেকে দূরে কবর দেওয়া হবে। ৩. ব্যবহৃত প্যাকেজগুলিকে তাদের পুনঃব্যবহার রোধ করার জন্য বাইরে রেখে দিতে হবে।

স্টোরেজ শর্ত: ১. ছত্রাকনাশক সম্বলিত প্যাকেজটি আলাদা ক বা প্রাঙ্গনে সংরণ করতে হবে, অন্যান্য জিনিসপত্র বিশেষ করে খাদ্য সামগ্রী সংরণের জন্য ব্যবহৃত রুম বা প্রাঙ্গণ থেকে দূরে বা ছত্রাকনাশকের পরিমাণ এবং প্রকৃতির উপর নির্ভর করে তালা এবং চাবির নীচে আলাদা আলমিরাতে রাখতে হবে। ছত্রাকনাশক ২. কীটনাশক সংরণের জন্য ক বা প্রাঙ্গণগুলি ভালভাবে নির্মিত, বাতাসযুক্ত, ভাল আলোকিত এবং বায়ুচলাচল এবং বাষ্পের সাথে দূষণ এড়াতে যথেষ্ট মাত্রার হতে হবে।

রাসায়নিক গান:

ভ্যালিডামাইসিন ধ.র:	৩.০০% w/w
পলিঅক্সি ইথিলিন ননাইল ফিনাইল ইথার (ঘট-৮৫):	২.০০% w/w
সিলিকন-কণ-৭২ :	০.০১% w/w
পটাসিয়াম সোরবেট:	০.০৫% w/w
অ্যাসিড গ্রিন ডাই:	০.০১% w/w
জল:	Q.S.%
মোট:	১০০.০০% w/w

ভালিডামালসিন্ 3% L সিষ্ঠমিক্-আন্টিবায়ও টিক্|

ভালিডামালসিন্ 3% L হওেছে এক আন্টিফঙ্গাল্ প্রওতুতি এবং আন্টিবায়ও টিক্ কম্পাউণ্ড্। এটিওে কম্ স্তন্যপায়ী বিষাক্ততা রয়েছে এবং তাই একটি নিরাপদ আন্টিবায়োটিক। এটি শুধুমাত্র চাওল শীত্ বাইট্ নিয়ন্ত্রওণ জন্যে একটি কার্যকর আন্টিবায়োটিক|

সুপারিশ:

Crop (s)	Common Name of pest	a.i. (gm)	Dosage/Ha. Formu-lation (ml.)	Dilution in water (ltr.)	Waiting Period between last spray to harvest days
চাওল	শীত্ বিলাইট্ না	60	2000	750	হওোয়ওে রহিযা উচিত্| অবশিষ্ট শস্য এবং ধানওে নড়া|14 দিন পুরওবু|আগওে

ব্যবহারের নির্দ্দেশ: P.P. যন্ত্রওপাতি: নাপসাক্ স্প্রেওর, ফুট্ স্প্রেওর, সহ্কাওচ নাপস্প্রেয়ার্ স্প্রেওর, সহ্কাওচ নাপস্প্রেয়ার্ ব্যাটওরী এবং ASPEE-HTP পাওয়ার্ স্প্রেওর্ ভ্রওয়াবি ভালালডামালসিন্ অধিকাংশ সাধারওণ কীতওনাশক সহিত সুযঙ্গত|

সতর্কতা: 1. শ্যাদ্য সামগ্রী, খালি খাদ্য সামগ্রী পাত্র এবং পশুমানত খাদ্যবালু দিঅনন্তু | 2. পাতি, আঁখি এবং চর্ম্ম সহিত সম্পর্কওু দূরওে রুহনন্তু | 3. স্প্রওর কুহুড়িতু নিশ্বাস নওবো াওতু দূরওে রুহনন্তু | পবন দিগওর স্প্রওর করনন্তু |4. স্প্রওর করিবা পওর দূষিত পওোষাক এবং শরীরওর কিছি অংশকু ভাল ভাবওর ধৌ াই দিঅনন্তু | 5. স্প্রওর করিবা সময়ওর ধূমপান করনন্তু নাহিঁ, পিঅনন্তু নাহিঁ, খাআনন্তু নাহিঁ এবং চর াবনন্তু নাহিঁ | 6. মিশ্রণ এবং স্প্রওর করিবা সময়ওর পুরণ্রিণ প্রতিরক্ষা পওোষাক পিন্ধনন্তু |

বিষর লক্ষণ: মুণ্ডতবিন্ধা, চমক, বান্তি, বান্তি এবং চিন্তা হওোইপারওে |

প্রাথমিক সহায়তা পদক্ষেপে: 1. যদি গিলি দিআযাও, রাক্ষার পষ্ঠ পওকু চিহ্ন করি বান্তি কর | আমকু বান্তি নহবো পর্য্যন্তন্ত এহাকু পুনরাবৃত্তি করনন্তু | রওোগী চেতোশূন্যয় হওলে বান্তি দ্বৃষ্টি করনন্তু নাহিঁ | 2. যদি পওোষাক এবং চর্ম্ম দূষিত হুয়, তেবে পওোষাক কা removে দূষিত চর্ম্মকু ভহু পরিমাওর সাবুন এবং পাণিরও ধৌ াই দিঅ | 3. যদি আঁখি দূষিত হুয়, তেবে প্রায় 10 রু 15 মিনিট্ পর্য্যন্তন্ত প্রচুরু স্যালাইন্ / বিশুদ্ধ পাণি সহিত ফ্লাশ্ করনন্তু | 4. যদি নিশ্বাস প্রশ্বাস দিআযাও, রওোগীকু তাজা পবনরওে বাহার করনন্তু |

ফাইটোটক্সাইসিটি: পরামর্শিত মাত্রারওে ফসল করিবা পাই ভালিডামালসিন্ ফাইটোটক্সিক্ নুহেঁ |

প্রতিকার: কনিত্রুদ্বিষ্ট্ ঔষি নিত্রুদ্বিষ্ট্ আন্টিডোট্ জণা নাহিঁ | লক্ষণগত ভাবওর চিকিত্সা করনন্তু |

ব্যবহার পাত্রর নিষ্পত্তিকরণ: 1. প্র্যাকজে্ কিম্বা অতিরিক্ত সামগ্রীকু বিসর্জন করিবা পাই প্রস্তুমুলকওে এবং অপরাটওরওক্ কর্ত্তব্য হবে এবং যন্ত্রওপাতিরু ধৌ াইবা এক নিরাপদ manner ত্বরওর বিসর্জন করাযিবা ঊচিত যাহা দ্ পরিবওশে াও পরিবওশে কিম্বা জল প্রদূষণকু রওোকাযাইপারিবা | 2. প্র্যাকজেগুড়িক ভাঙ্গি বাসস্থানঠারু দূরওে টোটি দিআযিব | 3. পুন used ব্যবহারকু রওোকিবা পাই ব্যবহৃত প্র্যাকজেগুড়িকু বাহারওে ছাড়ি দিআযিব |

সংরক্ষণ সর্ত্ত: ১. ফঙ্গিসাইড্ ধারণ করিথিবা প্র্যাকজে্ অলগা কওোঠরী কিম্বা পরিসরওে রখাযিব, ওুগ কিম্বা অন্যান্য আন্টিবিক্স্ বিশেষে food খাদ্যয় সামগ্রী সংরক্ষণ পাই ব্যবহৃত কওোঠরীঠারু দূরওে রখাযিব কিম্বা এহার পরিমাণ এবং প্রকৃতি উপরে নির্ভর করি অলগা আলমিরারওে তালা এবং চাবি তলে রখাযিব | ২. কীতনাশক সংরণ্রওর জন্য ক বা প্রাঙ্গণ্গুড়িক ভালা এবং ভাবি তলে রখাযিব | ফঙ্গিসাইড্ | 2. কীতনাশক সংরক্ষণ পাই ঊবদ্বিষ্ট কওোঠরী কিম্বা পরিসরে এবং বাষ্প সহিত প্রদূষণকু এড়াইবা পাই ভাল ভাবওর নির্ম্মিত, বায়ুসঞ্চালিত, ভাল আলোকিত এবং ভেণ্টিলেটেড্ এবং পর্য্যাপ্ত পরিমাণর নির্ম্মাণ হবে |

রাসায়নিক রচনা:

ভালিডামালসিন্ a.i:	3.00% w/w |
পলিঅক্সি এথিলিন্ নোনিল্ ফেনিল্ ঊথর (NP-85):	2.00% w/w |
সিলিকন্- KM-72:	0.01% w/w |
পটাসিয়াম্ সর্ব্বেট্:	0.05% w/w |
এসিড্ সবুজ্ রঙ্গ:	0.01% w/w |
জল:	Q.S.%
সমুদায়:	100.00% w/w

বালিদামালসিন্ 3% এল-অন্তর্ত্বাহিক ব্যাক্টিরিয়ানাশক

বালিদামালসিন্ 3% এল্. অনেসবি শৈলিদ্ধমুলেস মরিয়া ব্যাক্টিরিয়ালেস অরিকষ্টু এক মূল পদার্থ্যুম. ইবি ষ্টিরদমুলেস বিষক্তল্যুম কাদু কাযুন ষ্টেমদাদ্যাযস্তুমেন ব্যাক্টিরিয়ানাশন. ইবি অত্যন্ত প্রভিহাবওমন্তমেন ব্যাক্টিরিয়ানাশন. দীনিন বিপ্রেরু নাশেম পাদষ্টেগুলেস অরিকষ্টুতকু মাত্রেমঁ উপযোগিওবইলেম.

সিফারসুলে :

পৈরু(লু) তৈগুলু সাধারণ নামমু	সা. (গ্রা.)	মোতাদু/সিস্ট্রাদুকু মন্দু দ্রাবণমু (মি.লি.)	নীরু পরিমাণমু (লিঃরু)	চিবরি সিচিকারি মুন্ডি কৈঙ্গল বরুকু বেচি যুন্ডেন সমযুন্ডমু (রোজুলু)
বরি	পাদ তৈগুলু	60	2000	750	বরি ধান্যমু পৈ, গন্ডিলে বরুকৈঙ্গকু মুন্দে 14 রোজুল সমযুন্ডমুলে চিবরৈমমুলু ঐদিমিগলবু

জুন্দে উপযোগিওমটুকু সুচবেনু :যন্ত্রে বরিকরমুলে :

নাপসাক্ স্প্রেপম্পু, কৈঙ্গুদু পম্পু, গালি ঊত্তিঊলিপৈ পনিবৈযু নাপসাক্ স্প্রেপম্পু, নাপসাক্ ব্যাটরি স্প্রেপম্পু মরিয়া অস্প্রে-হিপৈটিট্টি পবর্ স্প্রেপম্পু.

বালিদামালসিন্ 3% এল্. অন্দ্রি সাধারণ কীটকনাশমুলপৈ বাগা কলিসি পৌকুন্দি.

মুন্দে জাগ্রত্তুলু :

1. মন্দুনু অহারপদার্থ্যুমুলু খালি পাত্রলু মরিয়া পশুগ্রাপালকু দূরওেগা উণ্ডেন্দি.
2. মন্দুনু মুখমু, কন্নু মরিয়া বর্ত্তমুনকু শুনুলনীযবদ্দু.
3. মন্দুনু পীল্যবদ্দু, গালি বালুগা পিচিকারি বৈযুবলেনু.
4. কলুষিত দুস্তুলু মরিয়া বর্ত্তমুনু বাগা শুভ্রপরচুকৈনবলেনু.
5. পিচিকারি বৈযুনপুডু পাগ্রাগদেম, ত্রাগদেম, শিসদেম মরিয়া ঐদৈনা সমুলুলু বণ্ডেটি বৈযুরাদু.
6. মন্দু দ্রাবণম কলুপুবপুডু মরিয়া পিচিকারি বৈযুনপুডু সুরক্ষিতমেন দুস্তুলু ধরিণবলেনু.

বিষপ্রয়োগ লক্ষণালু : কলনৌপ্যু, বান্তুলু, উব্বুসম, বিকারম, আন্দোলন কলগবচ্চু.

প্রথম চিকিত্সা চর্য্যলু :

1. ঒ঙেল দীন্যি মিংগৈনিসট্টুযুতৈ, গৌন্তুলপৈ বেলুপৈট্টি বান্তি বৈযুন্দেবলে. বান্তি পূর্ত্তিগা, অন্তা ঊযটেই বৈপ্যৈনদেকা মল্যি মল্যি বৈযুন্দি.
2. স্পৃহকপ্যুন্তুন্ন ব্যক্তিনি বান্তি বৈযুনদৈনুন্তু, লেদা নৌকিদ্বারা ঐদৈনা ঊপ্যৈন্দুযু উপ্যুক্তম প্রযুক্তিযুন্দবচ্চু.
3. ঒ঙেল বিষপূরিতমৈপৌকুন্যুবন্ন অনুমানং বস্তে বেণ্টনে বৈদ্যুনি সংপ্রদিণ্ডবলেনু.
4. ঒ঙেল ইদি চর্ম্মপৈ, চর্ম্মপৈ পদিনট্টুযুতৈ, সব্বু উপযোগিণ্ডে শুভ্রমৈন নীটিতো ধারণংগা 10-15 নিমিষালপাটু চরগণ্ডি. ঒ঙেল দীন্যি পীল্যিনট্টুযুতৈ, বাধিতুনি অযুবযুটু গালিকি ঈসুকুনৌবর্ত্তুন্দি.

বিঊকুল্যুতা :

সুচিণ্ডেবঊদিন মোতাদুলপৈ পৌলুমলপৈ বাডিসপুডু হানিকরমু কাদু.

মোগুদু :

প্রত্যেকমৈন তৈলিসিন বিরুগুদণ্ডেটা ঐদিঁ লেদু. রোগ লক্ষণালু প্রকারমু চিকিত্সা চেযুলি.

নিল্যু বৈযুটু :

1. কীটকনাশনি গল প্যাকিংগুলনু, প্রত্যেকমৈন গদুলপৈ যিতর সরুকুলু নিল্যুযুণ্ডে অবরুনকু মুরংগা, বাটি পরিমাণম মরিয়া বিলুবনু বল্টি প্রত্যেকমৈন অল্পুবল্টে তাখণ বৈসি পুণ্ডবলি.
2. কীটকনাশনি গোদামুলুগা ঐনচুকুন্যু গদুলু, বিশালংগা, দৃঢমৈনবিগা, চেম্মু লেকুণ্ডা যুন্ডেনি, গালি, বেলুকুবু দ্বারাখণ্ডা প্রসরিণ্ডে বিধংগা ঐনচুকৌবলি.

ঊখী ডব্বালু, মিগিলিন মন্দু, যন্ত্রমুলু কঢিগিন নীরু বিসর্জিণ্ডু পদ্ধতি :

1. ডব্বালনু পগুলগিট্টি জনবাসপৌকুনু দূরংগা পাতিপেট্টুবলি.
2. ঊখী অযিন ডব্বালনু মল্যি পুপযোগিণ্ডেন্দুকু ঈলু কাকুণ্ডা নির্ম্মুলিণ্ডবলি.
3. ঊখী প্যাকেজিংগুলকু, মিগিলিন পদার্থ্যুলু মরিয়া পরকরালু কঢিগিন নীটিনি, বাতাবরণম মরিয়া নীটিনপরুলু কলুষিতম কানি বিধংগা নির্ম্মুলিণ্ডবলি.

রসাযনিক সম্মেলনম :

বালিদামালসিন্ (এ.আ.)	: 3.00% ডব্লু/ডব্লু
পলিঅক্সি এথিলিন্ নোনেল্ঈথর (এন্.পি-85)	: 2.00% ডব্লু/ডব্লু
সিলিকন্ কে এম্-72	: 0.01% ডব্লু/ডব্লু
পোটাসিয়ম সর্ব্বেট্	: 0.05% ডব্লু/ডব্লু
যাসিড্ গ্রিন্ ডৈ	: 0.01% ডব্লু/ডব্লু
নীরু	: হ্যু.এস.
মোত্তম	: 100.00% ডব্লু/ডব্লু

Valicide

Validamycin 3% L systemic-Antibiotic

वालीडामाईसिन ३प्रतिशत सांद्र अंर्तप्रवाही प्रतिजैविक

भालीसाइड

বভ্যালিডামাইসিন ৩% এল সিস্টেমিক-অ্যান্টিবায়োটিক

ভ্যালিসাইড

ভালিডামালসিন্ 3% L সিষ্ঠমিক্-আন্টিবায়ও টিক্

CAUTION : NOT TO BE USED ON CROPS OTHER THAN SPECIFIED ON THIS LABEL/LEAFLET

Manufactured By:

Vedic Agro Science Pvt. Ltd.

(An ISO 9001 : 2015 & 14001 : 2015 Certified Company)

40, Strand Road, 5th Floor, Room No. 26

Kolkata - 700 001, West Bengal

Helpline : 033 2262 2441

E-mail : vedic@vedicagro.com

Manufacturer Premises:

Vill. Baligori, P.O. Baligori,

P.S.: Tarakeswar, Dist.: Hooghly

West Bengal, Pin.: 712 410

For any complaints contact customer service Executive.

Vedic Agro Science Pvt. Ltd.

Corp. Off : 40, Strand Road, 5th Floor, Room No. 26

Kolkata - 700 001, West Bengal

Helpline : 033 2262 2441

Email : vedic@vedicagro.com