2,4-D AMINE SALT 58% S.L. (HERBICIDE)

2,4-D amine salt is a selective herbicide effective against broad leaved weeds in Sorghum. Maize. Wheat, Sugarcane, Potato, Tea & non Cropped areas. It is also effective against some Aquatic weeds.

Recommendation:

Crop	Common name of	a.i. (Kg.)	Dosage per Hectare Formu-lation(litre)	Dilution water (litre)	Witting Period between last spray to harvest (Day)
Sorghum	Cyperus iria, Striga spp., Thianthema spp. Tridax procumbens Digera arvensis Convlvulus arvensis Euphorbia hirta, Euphorbia hirta phyllanthus niruri	1.8	3.00	500-600	-
Maize	Trianthema Monogynae, Amaranthus sp., Tribulus terreistris Boerheavia diffusa, Euphorbia hirta, Portuluca oleracea, cyperus sp.	0.5	0.86	400-500	50-60
Wheat	Chenopodium album, Asphodelus Tenulolius, Fumeria spp, Melotus alba Convolvulus arvensis.	0.5-0.75	0.85-1.30	500-600	-
Sugarcane	Cyperus irir,Digitaria spp. Dactyloctenium aegypticum Digera arvensis Porlulaca olieracea Commelina beghalensis Convolvulus Arvensis	3.5	6.0	500	-
Aquati Weeds	Eichhornia crassipes	0.5-1.0	0.85-1.70	600-700	-
Potato	Chenopodium album Asphodelus tenuiifolius Convolvulus arvensis Portulaca oleracea	2.00	3.50	400	-
Tea	Digitaria Sp. Boerhavia hispida	0.8	1.40	500	-
Non Crop Area	Parthenium hysterophorous Cyperus rotundus	2.65 2.5	4.50 4.5	300-400 300	- -

Time of Application : Sorghum : Post emergence, apply when sorghum is 10-30 cm tall. Maize : Pre emergence. 2-3 days after the sowing of crop. Wheat : Post emergence, 30-35 days after sowing of crop. Sugarcane : Pre emergence or Post emergence. 6 weeks after planting cane. Aquatic weeds : When weeds are young & actively growing. Potato : Pre emergence of crop/weed. Tea : When the weeds are young & actively growing. Non Crop Area : Parthenium hysterophorous : When the weeds are young & actively growing. Non crop Area : Spraying should be made in fallow land. Mode of application : Mostly blanket application.

Direction of use : Plant Protection Equipment : Knapsack sprayer, foot sprayer, compression battery sprayer & ASPEE-HTP power sprayer fitted with flat fan or flood jet nozzle. Limitation & Caution for use : Do not spray the crop in neighborhood of cotton potato, chillies, tomato & grapes as they are very susceptible, Do not use those situations where there is possibility of harming flies. Avoid spray drift. Keep live stock away from spray area for the last two weeks. Do not store need seeds, fertilizer & insecticides. Do not inhale or mix with bare hands.

Precaution : 1. Keep away from foodstuff, empty foodstuff containers and animals food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. spray in the direction of wind. 2. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying.

Symptoms of Poisoning : Nausea, Headache, weakness, diarrhoea, spasticity of muscles of the hands & feet. There may by hyperpyrexia in few cases. Death may occur due to ventricular fibrillation or cardiac arrest.

First Aid : 1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomit us is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. 4. If inhaled take th patient in fresh air.

Antidote : Quinidine sulphate may be give to control myotonia or suppress abnormal ventricular cardiacrhyum. Treat symptomatically.

Storage : The packages containing the material shall be stored in separate rooms or premise spray from se rooms or premises used for storing other articles or shall be kept in separate admirals under lock and key responding upon the quantity and nature of the material. The rooms or premises meant for stoning them shall all be well-bulit, dry, well-lit, ventilated and of sufficient detentions.

Disposal of the Containers: The packages shall be broken and burried away from habitation. The used package. shall not be left put side to prevent their re-use. The used packages or surplus material and washings from equipment should be disposed off in safe manner so as to prevent environment or water pollution.

Chemical Composition :

2,4-D Acid Tech. (based on 95% w/w a.i.)	: 59.00% w/w
sequestering agent : Dimethyl amine	: 30.00% w/w
Lignin Sulphonate	: 1.00% w/w
Diluent (Aqua)	: 10.00% w/w
Total	:100.00% w/w

Caution : Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet.

२,४ - डी अमाइन साल्ट ५८% एस.एल (खरपतवारनाशक)

२,४-डी एक खरपतवार नाशक है जौकि ज्वार, मक्का, गेहूं, गन्ना, जलीय खरपतवार, आलू तथा चाय में खरपतवारों की रांकथाम करता हैं।

उपयोग :

फसल	खरपतवारों के नाम	प्रति हैक्टअर मात्रा स.तत्व. (कि.ग्रा.)	संरचना (ली.)	पानी को मात्रा (ली.)	अर्तिम छिड़काव तथा फसल काटर के बीच अंतराल (दिनो में)
ज्वार	पोला मोथागोखरू, पत्थर चटटा तुलक, लहसुआ हिरन खुरी बड़ी दुधी हजार दाना	१.८	३.०	५००-६००	-
मक्का	पत्थर चटटा जंगली चांलाई बडा गाखरू विसकपडा, बड़ा दुधी बड़ी नूनियां माथा	०.५	०.८६	४००-५००	५०-६०
गेहूँ	चथुआ प्याजी बौंसया सैजो बंधानियां	०.५-०.७५	०.८५-१.३०	५००-६००	-
गन्ना	मोथा, कंव घास मकरा मकरा ननियां कनकउआ जंगलो जोलाई हिरन खुरी	३.५	६.०	५००	-
जलोय खरपतवार	जलखुम्बी	०.५-१.०	०.८५-१.१०	६००-७००	-
आलू	बथुआ,प्याजी बड़ी दुधी बड़ी नूनियां	२.०	३.५	४००	-
चाय	कंव घास विष खपड़ा	०.८	१.४०	५००	-
बिना फसल परथंनियम		२.६५	४.५	३००-४००	-
का इलाका	जंगली मांधा	२.५	४.५	३००-४००	-

छिड़काव का समय : ज्वार : उगनं के बाद जव ज्वार का पौधा १०-३० से.मी. लम्बा हो जायें। मक्का : उदने मे पहले बुआई के २ से ३ दिन बाद। गेहूँ : उदने के बाद बुआई के ३० से ३५ दिन बाद। गन्ना : उदने से पहले या गन्ने के बोंने के ६ सप्ताह बाद। जलीय खरपतवार : खरपतवार जव अच्छी बढवार हो। आलू : फसल उग मे पहेल। जाय : जव खरपतवार छोटे हो व तेजी में बढ़ रहे हो। बिना फमल का इलाका : जंगलो मोथा, खाली भूमि में मीधा छिड़काव करें। उपयोग का तरीका मुख्य रूप में ब्लेकटे छिड़काव। उपयोग के लिये निर्देश : उपयोग में आने वाले यंत्रः नेपसेक स्प्रेयर, फूट स्प्रेयर, काम्प्रेशन नेपसेक बैटरी स्प्रेयर, और ए.एम.पी.ई.ई.एच.टी.पी. पावर स्प्रेयर, जिसमें फलैट फैन या फलड जैट नोजेल लगा हो।

प्रयोग की सीमायें तथा सावधानियां : जहो पर आलू, कपास, तम्बाकू, मिच, तथा टमाटर या अगूंर को फसल लो वहो पर उसका प्रयोग न करें। जहा पर मधुक्खियों का प्रभात्र हो वहो पर भी छिड़काव न करें। ड़िफट स्प्रे न करें। छिड़काव के दो सप्ताह तक किसी भी जानवर को छिड़काव क्षेत्र में न जाने दे। खरपतवार नाशको का संग्रह बीज, उर्वरक, तथा कीटनाशको के साथ न करें और न सूघ तथा न हो खूले हाथो मे प्रयोग करें।

प्रयोगकर्ताओं के लिये सावधानियाँ : १. खाद्यपदार्थ, खाद्यपदार्थों के खाली डिब्बें, तथा पशुखाद्यपदार्थ से दुर रखें। २. मुँह, आँखे तथा त्वचा से बचाव रखे। ३. प्रयोग करते समय श्वसन क्रिया एले। ४. प्रयोग विधी समपन्न होने के बाद दुषित कपडे तथा शरीर के विभिन्न अंगों को अच्छी तरह धो डाले। ५. प्रसारण विधि चल रही हो उस समय खाना या चबाना धुम्रपान पानी नही करना चाहिये। ६. छिड़काव करते समय सम्पूर्ण सवाधानीया बतनी चाहिए।

विष के लक्षण : कमजोरी, सिरदर्द, मितलों, दस्त, हाथा और पैरो की मांसपंशियों में ऐंठन, कुछ लोगो को तंज बुखार भी हो सकता है। ह्रदय गति के रूक जाने से मृत्यु हो सकतो है।

प्राथमिक चिकित्सा : १. यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करकं उल्टी करायें यह क्रिया यह क्रिया तव तक दोहरातें रहे जव तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाएं यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न करायें। २. यदि कपड़े और त्वचा दूषित हो जाये तो दूषित कपड़े उतार दें और त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से ३. यदि आंखं दूषित हो जाये तो उनको काफी मात्रआ में सेलाइन/साफ पानी से उगभग १०-१५ मिनट तक धोएं। ४. यदि खरपतवारनाशक सांम द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें।

विषनाशधः मायोटोनिया या हृदय गति के असामान्य होने या रूकने को रोकने के लिए क्विनडाईन दिया जा सकता हैं। लक्षणानुसार ईलाज करें।

भंडारण : १. कीटनाशक युक्त डिब्बों को किसी अलग कमरे में, जिसमें अन्य वस्तुएं जैसे खाने पीने की चीजे न रखी हो, अलग अलमारी में ताला लगाकर रखें। २. अलमारी या कमरे का आकार दवा के किस्म एवं मात्रा पर निर्भर करेगा। ३. संग्रहण के लिऐ बने कमरे या स्थान ढीक, सूखे, हवादार, प्रकाशयुक्त व लम्बे चीड़े होने चाहिये।

पात्रों को नष्ट करना एवं यंत्रों से निकला हुआ पानी और बचा हुआ माल को निपटान : पैकेजों को तोडकर आबादी से दूर मिट्टी में गाड दें। दवा इस्तेमाल किए जाचुके पैकेजों को उनके दुबारा प्रयोग में आने से रोकने के लिए उन्हे बाहर खुला न छोड़े। प्रयुक्त पैकेजों या अवशिष्ट सामग्री तथा उपकरणों के प्रक्षालन का निपटान इस ढंग से करें ताकि पर्यावरण या पानी दूषित न हो।

रासायनिक संरचना:

२,३-डी ऐसिड टेक्निक (भार के हिसाब से ९७ प्रतिशत स.त. पर आधारित)	: ५९.००% भार/भार
सिक्वेस्टीग एजेट : डाईमिथाइल अमाइन	: ३०.००% भार/भार
लिगनिन सल्फोनैट	: १.००% भार/भार
डायलूयेंट (एकवा)	: १०.००% भार/भार
कुल	: १००.००% भार/भार

सावधानी : लेबल / पत्रिका पर निर्देशित फसलों के अलावा अन्य फसलों पर प्रयोग करना मना है।

২,৪-উ অ্যামাইন সল্ট ৫৮% ঝ.খ. (ভেষনাশক)

২,৪-উ অ্যামাইন সল্ট হল একটি বাছাইকৃত ভেষজনাশক যা জোরার বিস্তৃত পাতাযুক্ত আগাছার বিরুদ্ধে কার্যকর। ভুট্টা. গম, আখ, আলু, চা এবং অ-ফসলযুক্ত এলাকা। এটি কিছু জলজ আগাছার বিরুদ্ধেও কার্যকর।

সুপারিশ:

Recommendation:

Crop	Common name of	a.i. (Kg.)	Dosage per Hectare Formulation (litre)	Dilution water (litre)	Witting Period between last spray to harvest (Day)
সর্গাম	সাইপেরাস আইরিয়া, স্টিগা এসপিপি।, থিয়ানথেমা এসপিপি ট্রিডাক্স ড্রহড়পসনবহং দিগেরা আর্ভেনসিস কনভলভুলাস আরভেনসিস ইউফোরবিয়া হির্তা, ইফফোরবিয়া যরহংধ ফিলান্থাস নিরুপরি	১.৮	৩.০০	৫০০-৬০০	-
ভুট্টা	ট্রায়ানথেমা মনোগাইনি, অ্যামরান্থাস এসপি, ট্রিবুলাস টেরিস্ট্রিস বোযরেহেভিয়া ডিফুসা, ইউফোরবিয়া হির্তা,পর্তুলুকা ড়যরবংধপবধ, পুচরবংং য়ঢ়. গম	০.৫	০.৮৬	৪০০-৫০০	৫০-৬০
চেনোপোডিয়াম	অ্যালবাম, অ্যাসফোডেলাস টেন্যুলোলিয়াস, ফুমেরিয়া এসপিপি, মেলোটাস আলবা কনভলভুলাস আরভেনসিস। আখসাইপেরাস ইরির,	০.৫-০.৭৫	০.৮৫-১.৩০	৫০০-৬০০	-
ডিজিটারিয়া	এসপিপি ভ্যাক্টিলোকটেনিয়াম ইজিপটিকাম দিগেরা আর্ভেনসিস পোর্লুলাকা ড়যরবংধপবধ কমলিনা বেথালেনসিস কনভলভুলাস আরভেনসিস	৩.৫	৬.০	৫০০	-
অ্যাকোয্যাটি	উইডস ইচহোর্নিয়া ক্র্যাসিপস		০.৫-১.০	০.৮৫-১.৭০	৬০০-৭০০ -
আলু	চেনোপোডিয়াম অ্যালবাম অ্যাসফোডেলাস টেন্যুইফোলিয়াস কনভলভুলাস আরভেনসিস পোর্টুলাকা oleracea Pv	২.০০	৩.৫০	৪০০	-
ডিজিটারিয়া	এসপি. বোযরেহাভিয়া হিসপিডা	০.৮	১.৪০	৫০০	-
নন	ক্রপ পার্থেনিয়াম এলাকা হিস্টেরোফরাস	২.৬৫	৪.৫০	৩০০-৪০০	-
সাইপারাস	রোটান্ডাস	২.৫	৪.৫	৩০০	-

আবেদনের সময়: সোর্ঘাম: উত্থানের পরে, সোরঘাম ১০-৩০ সেমি লম্বা হলে প্রয়োগ করুন। ভুট্টা: প্রাক উত্থান। ফসল বপনের ২-৩ দিন পর। গম : আবির্ভাবের পরে, ফসল বপনের ৩০-৩৫ দিন পরে। আখ: আবির্ভাবের পূর্বে বা উত্থানের পরে। বেত লাগানোর ৬ সপ্তাহ পর। জলজ আগাছা: যখন আগাছা তরুণ এবং সক্রিয়ভাবে বৃদ্ধি পায়। আলু: শস্য/আগাছার প্রাক উদ্ভব। চা: যখন আগাছা তরুণ এবং সক্রিয়ভাবে বৃদ্ধি পায়। অ-ফসল এলাকা: পার্থেনিয়াম হিস্টেরোফরাস: যখন আগাছা তরুণ এবং সক্রিয়ভাবে বৃদ্ধি পায়। অ-ফসল এলাকা: পতিত জমিতে স্প্রে করতে হবে। আবেদনের পদ্ধতি: বেশিরভাগই কম্বল অ্যাপিকেশন।

ব্যবহারের দিকনির্দেশ: উদ্ভিদ সুরা সরঞ্জাম: ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার, ফুট স্প্রেয়ার, কম্প্রেশন ব্যাটারি স্প্রেয়ার এবং ফ্ল্যাট ফ্যান বা ফ্লাড জেট অগ্রভাগের সাথে লাগানো অথাচউউ-এঐচ পাওয়ার স্প্রেয়ার। ব্যবহারের জন্য সীমাবদ্ধতা এবং সতর্কতা: তুলা আলু, মরিচ, টেমেটো এবং আঙ্গুরের আশেপাশে ফসল স্প্রে করবেন না কারণ তারা খুব সংবেদনশীল, মাছিদের তি করার সম্ভাবনা আছে এমন পরিস্থিতিতে ব্যবহার করবেন না। স্প্রে প্রবাহ এড়িয়ে চলুন. গত দুই সপ্তাহ ধরে স্প্রে এলাকা থেকে লাইভ স্টক দূরে রাখুন। প্রয়োজনীয় বীজ, সার ও কীটনাশক সংরণ করবেন না। খালি হাতে শ্বাস নেবেন না বা মেশাবেন না।

সতর্কতা: ১. খাদ্যসামগ্রী, খালি খাবারের পাত্র এবং পশুর খাবার থেকে দূরে রাখুন। ২. মুখ, চোখ এবং ত্বকের সাথে যোগাযোগ এড়িয়ে চলুন। ৩. স্প্রে কুয়াশা ইনহেলেশন এড়িয়ে চলুন. বাতাসের দিকে স্প্রে করুন। ২. স্প্রে করার পরে দূষিত কাপড় এবং শরীরের অংশগুলি ভালভাবে ধুয়ে ফেলুন। ৫. স্প্রে করার সময় ধূমপান করবেন না, পান করবেন না, খান এবং চিববেন না। ৬. মিশ্রণ এবং স্প্রে করার সময় সম্পূর্ণ প্রতিরামূলক পোশাক পরুন।

বিষক্রিয়ার লণ : বমি বমি ভাব, মাথাব্যথা, দুর্বলতা, ডায়রিয়া, হাত ও পায়রে পেশীর স্প্যাস্টিসিটি। কিছু ত্রেে হাইপারপাইরেক্সিয়া হতে পারে। ভেন্ট্রিকুলার ফাইব্রিলেশন বা কার্ডিয়াক অ্যারেস্টের কারণে মৃত্যু ঘটতে পারে।

প্রাথমিক চিকিৎসা: ১. গিলে ফেলা হলে, গলার পিছনে সুড়সুড়ি দিয়ে বমি করান। আমাদের বমি পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ড়এটি পুনরাবৃত্তি করুন। রোগী অজ্ঞান হলে বমি করবেন না। ২. যদি পোশাক এবং ত্বক দূষিত হয়, কাপড় সরিয়ে ফেলুন এবং দূষিত ত্বক প্রচুর পরিমাণে সাবান এবং জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। ৩. চোখ দূষিত হলে, প্রায় ১০ থেকে ১৫ মিনিটের জন্য প্রচুর স্যালাইন/পরিষ্কার জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। ৪. শ্বাস নেওয়া হলে রোগীকে তাজা বাতাসে নিয়ে যান।

প্রতিষেধক: মায়োটোনিয়া নিয়ন্ত্রণ করতে বা অস্বাভাবিক ভেন্ট্রিকুলার কার্ডিয়াক্রিয়াম দমন করতে কুনিডিন সালফেট দেওয়া যেতে পারে। লণগতভাবে চিকিত্সা করুন।

সঞ্চয়স্থান: উপাদান সম্বলিত প্যাকেজগুলি আলাদা কং বা অন্যান্য প্রবন্ধ সংরণের জন্য ব্যবহৃত প্রাঙ্গণ থেকে পৃথক কং বা প্রিমাইজ স্প্রেতে সংরণ করা হবে বা উপাদানের পরিমাণ এবং প্রকৃতির উপর সাড়া দিয়ে তালা এবং চাবির অধীনে পৃথক অ্যাডমিরালওলিতে রাখা হবে। পাথর মারার জন্য যে ক বা প্রাঙ্গণগুলিকে বোঝানো হয়েছে সেগুলি সবগুলিই ভাল-বুলিট, শুষ্ক, ভালভাবে আলোকিত, বায়ুচলাচল এবং পর্যাপ্ত আটক থাকতে হবে।

পাত্রের নিষ্পত্তি: প্যাকেজগুলি ভাঙ্গা এবং আবাসস্থল থেকে দূরে পুঁতে ফেলতে হবে। ব্যবহৃত প্যাকেজ। তাদের পুনঃব্যবহার রোধ করার জন্য পাশে রাখা যাবে না। ব্যবহৃত প্যাকেজ বা উদ্বৃত্ত উপাদান এবং সরঞ্জাম থেকে ওয়াশিং নিরাপদ পদ্ধতিতে নিষ্পত্তি করা উচিত যাতে পরিবেশ বা জল দূষণ প্রতিরোধ করা যায়।

রাসায়নিক রচনা :

২,৪-ডি অ্যাসিড টেক। (৯৫% w/w a.i. এর উপর ভিত্তি করে):	৫৯.০০% w/w
সিকোয়স্টেরিং এজেন্ট: ডাইমিথাইল অ্যামাইন:	৩০.০০%w/w
লিগনিন সালফোনেট:	১.০০%w/w
তরল (অ্যাকোয়া):	১০.০০%w/w
মোট:	১০০.০০%w/w

সতর্কতা: এই লেবেল/লিফলেটে উল্লেখ করা ছাড়া অন্য ফসলে ব্যবহার করা যাবে না।

VEDIC 2 4D

2,4-D AMINE SALT 58% S.L.
(HERBICIDE)

वेदिक 2 4D

२,४ - डी अमाइन साल्ट ५८% एस.एल
(खरपतवारनाशक)

বৈদিক 2 4D

২,৪-উ অ্যামাইন সল্ট ৫৮% ঝ.খ.
(ভেষনাশক)

ବୈଦିକ୍ 2 4D

2,4-D ଆମିନ ସଲ୍ଟ 58% S.L.
(ହରବିକାଇଡ୍)

CAUTION : NOT TO BE USED ON CROPS OTHER THAN SPECIFIED ON THIS LABEL/LEAFLET

Manufactured By:

Vedic Agro Science Pvt. Ltd.

(An ISO 9001 : 2015 & 14001 : 2015 Certified Company)
40, Strand Road, 5th Floor, Room No. 26
Kolkata - 700 001, West Bengal
Helpline : 033 2262 2441
E-mail : vedic@vedicagro.com

Manufacturer Premises:

Vill. Baligori, P.O. Baligori,
P.S.: Tarakeswar, Dist.: Hooghly
West Bengal, Pin.: 712 410

For any complaints contact customer service Executive.
Vedic Agro Science Pvt. Ltd.
Corp. Off : 40, Strand Road, 5th Floor, Room No. 26
Kolkata - 700 001, West Bengal
Helpline : 033 2262 2441
Email : vedic@vedicagro.com

EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE

2,4-D ਅਮੀਨ ਸਲਟ 58% S.L. (ਹਰਬਿਕਾਇਡ)

2,4-D ਅਮੀਨ ਲੂਣ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿਸਟਰ ਵਿਰੁਦ੍ਧ ਪਰਦਾਰ ਦੁਆਰ ਵਿਰੁਦ੍ਧਦੇ ਏਕ ਸਨਦ ਜਿਨਾਂਦ b ਸ਼ਬਦੀਕ ਬੁਰਕ। ਸਕਾ ਗਰਮ, ਆਖ਼ੂ, ਆਲੂ, ਹਾ ਏਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਦ ਆਣ੍ਹਚਕ। ਏਹਾ ਕਤਦੇਕ ਕਕਾਯ ਦੁਆਰ ਵਿਰੁਦ੍ਧਦਰ ਮਧਯ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ।

ਸੁਹਾਕਿਸ਼:

Crop	Common name of	a.i. (Kg.)	Dosage per Hectare Formulation(litre)	Dilution water (litre)	Witting Period between last spray to harvest (Day)
ਸਰ ਗਿਮ੍	ਸਾਫਰਯਰ ਕਰਿਆ, ਬ੍ਰਦ੍ਰਿਗਰ spI, ਈਸ਼ਾਣ੍ਟਮੋ spp ਦ੍ਰਗਲਡਾਦ੍ਯ। ਪ੍ਰਾਰਰ ਜਮ੍ਪ੍ਰਦਨ੍ਯ। ਚਿਕਿਰਾ ਆਰ੍ਯਲਨ੍ਯੇਸ੍ਰ੍। ਕਨਾਕਲਬ੍ਲਲਸ੍। arvensis ਲਫਟਰ ਹਰ੍ਦੇਆ ਇਰਤਾ, ਲਫਟਰ ਹਰ੍ਦੇਆ ਇਰਤਾ। phyllan ਏਫੋਧਿ ਨਿਰ੍ਹਰਾ।	1.8	3.00	500-600	-
ਮਕਾ	ਦ੍ਰਗਲਏਣ੍ਟਮੋ ਮਰ ਜਨਰ ਗਗਲਜਨਾ, ਅਮਰਗਨਅਸ੍ ਸ੍ਪਤ। ਦ੍ਰਰਿਕੁਲਸ੍ ਦਰਇਸ਼੍ਦ੍ਰਿਰ੍। ਵਰ ਗਰਅਇਆ diffusa, ਲਫਟ ਹਰ੍ਦੇਆ ਇਰਤਾ, ਪਰ ਹਰ੍ਗੁਕੁਲਾ। oleracea, ਸਾਕਪਰਰਯ੍ ਸ੍ਪਤ।	0.86	400-500	50-60	
ਚਕਮ	ਚਰਜਨ ਪਰ ਓਤਿਮ੍ ਆਕਲਵਮ੍, ਆਸਫਟ ਚਰਲਵ੍ਯ ਦਨ੍ਯੂਲਿਅ੍ਯ, ਯੂਗਰਗਿਆ ਸ੍ਪਤਿ, ਸਗਲਵ ਦਤਸ੍ ਆਲਬਾ। ਕਨਾਕ ਗਲਕੁਲਯ੍। arvensis।	0.5-0.75	0.85-1.30	500-600	-
ਆਖ਼ੂ	ਸਾਫਰਯਰ ਕਰਿਰ੍ਯ ਚਿਕਿਰਾਗਿਆ ਸ੍ਪਤਿ। ਰਾਜ੍ਦਾਲਕ ਗਕਨਿਯਮ੍ ਏਕਿਪ੍ਰਿਚਿਕਮ੍। ਚਿਕਿਰਾ ਆਰ੍ਯਲਨ੍ਯੇਸ੍ਰ੍। ਵਰਦ੍ਯਗਲਕਨਾਯੇਸ੍ਰ੍। oliveracea ਵਰਦ੍ਯਗਲਕਨਾਯੇਸ੍ਰ੍। ਕਨਾਕ ਗਲਕੁਲਯ੍। ਆਰ੍ਯਲਨ੍ਯੇਸ੍ਰ੍।	3.5	6.0	500	-
ਆਲੂ	ਦ੍ਰਰਿ ਲਫਰਹਰ੍ਨਿਆ ਕ੍ਰਗਰਾਗਲਯ੍	0.5-1.0	0.85-1.70	600-700	-
	ਚਰਜਨ ਪਰ ਓਤਿਮ੍ ਆਕਲਵਮ੍ ਆਸਫਟ ਚਰਲਵ੍ਯ ਦਨ੍ਯੂਲਿਅ੍ਯ। ਕਨਾਕ ਗਲਕੁਲਯ੍। arvensis।	2.00	3.50	400	-
	ਪਰ ਹਰ੍ਗੁਕੁਲਾ। oleracea ਸਾਕਪਰਰਯ੍ ਸ੍ਪਤਿਆ।	0.8	1.40	500	-
ਰਾ	ਚਿਕਿਰਾਗਿਆ ਸ੍ਪਤਾ	2.65	4.50	300-400	-
ਅਣ	ਕ੍ਰਰਯ੍ ਪਾਕ੍ਰਚਨਿਯਮ੍ ਕ੍ਰਰਦ੍ਰਦ੍ਰ ਇਥਿਦਰਰਚ ਪਰ ਗਰਅਸ੍।	2.5	4.5	300	-

ਸਾਕਪਰਰਯ੍ ਰਰ ਹੁਣ੍ਦਯ੍ਰ

ਪ੍ਰਰਯਤ ਗਰਰ ਸਮਯ: ਸਰ ਗਿਮ੍: ਪਰ ਗਥ੍ਟ ਆਵਿਰ੍ਭਾਵ, ਸਰ ਗਿਮ੍ 10-30 ਸਰੰਮਿ ਉਦ੍ਯ ਹਲਦੇ ਪ੍ਰਰਯਤ ਗਰ ਕਰਨ੍ਦੂ। ਮਕਾ: ਪੂਰ੍ਵਦ ਆਵਿਰ੍ਭਾਵ। ਯਾਕਲ ਕੁਰੀਵਾਰ ਤੋਂ 2-3 ਦੇਨ ਪਰਰ। ਗਰਮਾ: ਯਾਕਲ ਕੁਰੀਵਾਰ 30-35 ਦੇਨ ਪਰਰ ਆਵਿਰ੍ਭਾਵ। ਆਖ਼ੂ: ਪੂਰ੍ਵਦ ਆਵਿਰ੍ਭਾਵ ਕਿਮ੍ਯਾ ਪਰ ਗਥ੍ਟ ਆਵਿਰ੍ਭਾਵ। ਵਾਢ੍ਹਿ ਰਰ ਹਪਰਰ 6 ਸਧਰਾਚ ਪਰਰ। ਭਲਾਸ਼ ਦੁਆਰ: ਯਤਦੇਕਦੇਕ ਦੁਆਰ ਕੁਯਕ ਯੂਯਕ ਏਕਾਂ ਕਰਿਰ੍ਯ। ਚ growing ਕ੍ਰਿ। ਆਲੂ: ਯਾਕਲ / ਦੁਆਰ ਪੂਰ੍ਵਦ ਆਵਿਰ੍ਭਾਵ। ਰਾ: ਯਤਦੇਕਦੇਕ ਦੁਆਰ ਛਤ ਏਕਾਂ ਸਰ੍ਦ੍ਰਿਯ ਭਾਵਰਰ ਚ growing ਰ। ਅਣ ਯਾਕਲ ਕ੍ਰਯਤ੍ਰਦ੍ਰ: ਪਾਰ੍ਦਤਨਿਯਮ੍ ਇਥਿਦਰਰਚ ਯਾਰ੍ਯ: ਯਤਦੇਕਦੇਕ ਦੁਆਰ ਯੂਯਕ ਏਕਾਂ ਕਰਿਰ੍ਯ ਭਾਵਰਰ ਚ growing ਕ੍ਰਿ। ਅਣ ਯਾਕਲ ਕ੍ਰਯਤ੍ਰਦ੍ਰ: ਪਰਿਚਯਾਰਮ੍ ਜਮਿਰਰ ਸ੍ਪਤ੍ਰਰ ਕਰਿਰਾ ਭਰਿਰ੍। ਪ੍ਰਰਯਤ ਗਰਰ ਧਾਰਾ: ਪ੍ਰਰਯਤ੍ਰ blan ਭਰਾਕਰ ਪ੍ਰਰਯਤ੍ਰ ਗਰ।

ਕ੍ਰਯਕਵਾਗਰਰ ਦਿਰ: ਭਰ੍ਪਿਰ ਦੁਆਰ ਕੁਯਕ੍ਰਯ ਗਰਯਕਰਣ: ਪ੍ਰਮਾਤ ਪ੍ਰਮਾਨ੍ ਕਿਮ੍ਯਾ ਵਨ੍ਯਗਾਕਰ ਭਰਦ੍ ਨਰ ਗਕਲ੍ ਸਵਿਤ ਰਾਜ੍ਦਾਲਕ ਗਕਨਿਯਮ੍ ਏਕਿਪ੍ਰਿਚਿਕਮ੍। ਚਿਕਿਰਾ ਆਰ੍ਯਲਨ੍ਯੇਸ੍ਰ੍। ਵਰਦ੍ਯਗਲਕਨਾਯੇਸ੍ਰ੍। oliveracea ਵਰਦ੍ਯਗਲਕਨਾਯੇਸ੍ਰ੍। ਕਨਾਕ ਗਲਕੁਲਯ੍। ਆਰ੍ਯਲਨ੍ਯੇਸ੍ਰ੍। ਆਖ਼ੂਬਾਟਾ ਦ੍ਰਰ ਲਫਰਹਰ੍ਨਿਆ ਕ੍ਰਗਰਾਗਲਯ੍ 0.5-1.0 0.85-1.70 600-700 - ਆਲੂ ਚਰਜਨ ਪਰ ਓਤਿਮ੍ ਆਕਲਵਮ੍ 2.00 3.50 400 - ਆਸਫਟ ਚਰਲਵ੍ਯ ਦਨ੍ਯੂਲਿਅ੍ਯ। ਕਨਾਕ ਗਲਕੁਲਯ੍। arvensis। ਪਰ ਹਰ੍ਗੁਕੁਲਾ ਕਨਾਕ ਗਲਕੁਲਯ੍। ਆਰ੍ਯਲਨ੍ਯੇਸ੍ਰ੍। ਰਾ ਚਿਕਿਰਾਗਿਆ ਸ੍ਪਤਾ 0.8 1.40 500 - ਰਰ ਹਰਾਗਿਆ। ਇਸਿਪਤਿਆ ਅਣ ਕ੍ਰਰਯ੍ ਪਾਕ੍ਰਚਨਿਯਮ੍ 2.65 4.50 300-400 - ਕ੍ਰਰਦ੍ਰਦ੍ਰ ਇਥਿਦਰਰਚ ਪਰ ਗਰਅਸ੍। ਸਾਕਪਰਰਯ੍ ਰਰ ਹੁਣ੍ਦਯ੍ 2.5 4.5 300 -

ਪ੍ਰਰਯਤ ਗਰਰ ਸਮਯ: ਸਰ ਗਿਮ੍: ਪਰ ਗਥ੍ਟ ਆਵਿਰ੍ਭਾਵ, ਸਰ ਗਿਮ੍ 10-30 ਸਰੰਮਿ ਉਦ੍ਯ ਹਲਦੇ ਪ੍ਰਰਯਤ ਗਰ ਕਰਨ੍ਦੂ। ਮਕਾ: ਪੂਰ੍ਵਦ ਆਵਿਰ੍ਭਾਵ। ਯਾਕਲ ਕੁਰੀਵਾਰ 2-3 ਦੇਨ ਪਰਰ। ਗਰਮਾ: ਯਾਕਲ ਕੁਰੀਵਾਰ 30-35 ਦੇਨ ਪਰਰ ਆਵਿਰ੍ਭਾਵ। ਆਖ਼ੂ: ਪੂਰ੍ਵਦ ਆਵਿਰ੍ਭਾਵ ਕਿਮ੍ਯਾ ਪਰ ਗਥ੍ਟ ਆਵਿਰ੍ਭਾਵ। ਵਾਢ੍ਹਿ ਰਰ ਹਪਰਰ 6 ਸਧਰਾਚ ਪਰਰ। ਭਲਾਸ਼ ਦੁਆਰ: ਯਤਦੇਕਦੇਕ ਦੁਆਰ ਕੁਯਕ ਯੂਯਕ ਏਕਾਂ ਕਰਿਰ੍ਯ। ਚ growing ਕ੍ਰਿ। ਆਲੂ: ਯਾਕਲ / ਦੁਆਰ ਪੂਰ੍ਵਦ ਆਵਿਰ੍ਭਾਵ। ਰਾ: ਯਤਦੇਕਦੇਕ ਦੁਆਰ ਛਤ ਏਕਾਂ ਸਰ੍ਦ੍ਰਿਯ ਭਾਵਰਰ ਚ growing ਰ। ਅਣ ਯਾਕਲ ਕ੍ਰਯਤ੍ਰਦ੍ਰ: ਪਾਰ੍ਦਤਨਿਯਮ੍ ਇਥਿਦਰਰਚ ਯਾਰ੍ਯ: ਯਤਦੇਕਦੇਕ ਦੁਆਰ ਯੂਯਕ ਏਕਾਂ ਕਰਿਰ੍ਯ ਭਾਵਰਰ ਚ growing ਕ੍ਰਿ। ਅਣ ਯਾਕਲ ਕ੍ਰਯਤ੍ਰਦ੍ਰ: ਪਰਿਚਯਾਰਮ੍ ਜਮਿਰਰ ਸ੍ਪਤ੍ਰਰ ਕਰਿਰਾ ਭਰਿਰ੍। ਪ੍ਰਰਯਤ ਗਰਰ ਧਾਰਾ: ਪ੍ਰਰਯਤ੍ਰ blan ਭਰਾਕਰ ਪ੍ਰਰਯਤ੍ਰ ਗਰ।

ਕ੍ਰਯਕਵਾਗਰਰ ਦਿਰ: ਭਰ੍ਪਿਰ ਦੁਆਰ ਕੁਯਕ੍ਰਯ ਗਰਯਕਰਣ: ਪ੍ਰਮਾਤ ਪ੍ਰਮਾਨ੍ ਕਿਮ੍ਯਾ ਵਨ੍ਯਗਾਕਰ ਭਰਦ੍ ਨਰ ਗਕਲ੍ ਸਵਿਤ ਰਾਜ੍ਦਾਲਕ ਗਕਨਿਯਮ੍ ਏਕਿਪ੍ਰਿਚਿਕਮ੍। ਚਿਕਿਰਾ ਆਰ੍ਯਲਨ੍ਯੇਸ੍ਰ੍। ਵਰਦ੍ਯਗਲਕਨਾਯੇਸ੍ਰ੍। oliveracea ਵਰਦ੍ਯਗਲਕਨਾਯੇਸ੍ਰ੍। ਕਨਾਕ ਗਲਕੁਲਯ੍। ਆਰ੍ਯਲਨ੍ਯੇਸ੍ਰ੍। ਆਖ਼ੂਬਾਟਾ ਦ੍ਰਰ ਲਫਰਹਰ੍ਨਿਆ ਕ੍ਰਗਰਾਗਲਯ੍ 0.5-1.0 0.85-1.70 600-700 - ਆਲੂ ਚਰਜਨ ਪਰ ਓਤਿਮ੍ ਆਕਲਵਮ੍ 2.00 3.50 400 - ਆਸਫਟ ਚਰਲਵ੍ਯ ਦਨ੍ਯੂਲਿਅ੍ਯ। ਕਨਾਕ ਗਲਕੁਲਯ੍। arvensis। ਪਰ ਹਰ੍ਗੁਕੁਲਾ। oleracea ਸਾਕਪਰਰਯ੍ ਸ੍ਪਤਿਆ। ਰਾ ਚਿਕਿਰਾਗਿਆ ਸ੍ਪਤਾ 0.8 1.40 500 - ਅਣ ਕ੍ਰਰਯ੍ ਪਾਕ੍ਰਚਨਿਯਮ੍ 2.65 4.50 300-400 - ਕ੍ਰਰਦ੍ਰਦ੍ਰ ਇਥਿਦਰਰਚ ਪਰ ਗਰਅਸ੍। ਸਾਕਪਰਰਯ੍ ਰਰ ਹੁਣ੍ਦਯ੍ 2.5 4.5 300 -

ਸਾਕਪਰਰਯ੍ ਰਰ ਹੁਣ੍ਦਯ੍