# METALAXYL 35% WS

## SYSTEMIC FUNGICIDE

**Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified on This Label/leaflet".**

Introduction :

It is a highly active systemic fungicide. It is used as a wet slurry seed dresser. It effectively controls downy mildew in maize, bajra, sorghum and sunflower as well while rust in mustard.

Recommendation :

| Crop(s) | Common Name of disease | Dosage per 100kg seed A.I. (gm) | Formulation (gm) | Dilution in water (Ltr.) | Waiting Period Months |
|---|---|---|---|---|---|
| Mazie | Sorghum downy mildew<br>Sugarcane downy mildew, Phillippine downy mildew<br>Brown stripe downy mildew | 240 | 700 | 0.750-1.000 | 3.5-4.0 |
| Bajra | downy mildew | 200 | 600 | 0.750-1.000 | 3.0-3.5 |
| Sorghum | downy mildew | 200 | 600 | 0.750-1.000 | 3.5-4.0 |
| Sunflower | downy mildew | 200 | 600 | 0.750-1.000 | 3.5-4.0 |
| Mustard | White rust | 200 | 600 | 0.750-1.000 | 3.5-4.0 |

Symptoms of Poisoning :

Lethargy, difficulty in breathing, irritation in eyes, spasticity in muscles, abnormal posture may occur.

Antidote :

No specific antidote. Treat symptomatically.

First Aid :

Remove the patient to fresh air. If swallowed, induce vomit by tickling the back of throat. Wash contaminated skin with soap and water. Flush the eyes with plenty of clean water for at least 10-15 minutes.

Precautions by users : 1. Do not drink, eat or smoke while handling. 2. Avoid inhalation and skin contact. Do not mix with bare hands. 3. Use full protective clothing, rubber gloves, boots, face mask and rubber apron hood or at.

Storage : Store in cool dry, well-ventilated place under lock and key away from open flame, foodstuffs, children and animals.

Disposal : Packages shall be broken and buried away from habitation to prevent re-use. Surplus materials and washing should be disposed off in safe manner so as to prevent environmental and water pollution.

Warranty : All the goods supplied by us are of standard and uniform quality and we believe them well suited for use. Since their use is beyond our control and we can not exercise control over the or storage, handling, application etc., neither we nor the sellers assure any responsibility for any damage. injury or any consequences wat soever caused to or suffered by crops. equipment or personnel arising indirectly from such use.

# मैटालेक्सिल ३५% डब्ल्यू.एस.

## अंत:प्रवाही फफूंदीनाशक

चेतावनी : इस लेबल हस्तपत्रिका मे दी गई फसलो के अलावा अन्य कोईभी फसल पर इसका उपयोग ना करें ।

परिचय : एक अत्यधिक सक्रिय अंत:प्रवाही फफूंदी नाशक है । इस का उपयोग आद्र बीजोपचार के लिये होता है । यह मक्का, बाजरा, ज्वार और सूर्यमुखी में मृदुरोमिल फफूंदी एवं सरसों के सफेद किट्ट रोग का प्रभावी नियंत्र करता है।

सिफारिश:

| फसल | रोग के सामान्य नाम | मात्रा प्रति १०० कि.ग्रा. बीज स.तत्व. (ग्रा.) | संरचाना (ग्रा.) | प्रतीक्षा का समय पानी की मात्रा (लीटर) |
|---|---|---|---|---|
| मक्का | ज्वार मृदुरोमिल फफूंदी गन्ना मृदुरोमिल फफूंदी फिलिपाइन मृदुरोमिल फफूंदी भूरीधारी मृदुरोमिल फफूंदी | २४० | ७०० | ०.७५०-१.००० | ३.५-४ माह |
| बाजरा | मृदुरोमिल फफूंदी | २०० | ६०० | ०.७५०-१.००० | ३-३.५ माह |
| ज्वार | मृदुरोमिल फफूंदी | २०० | ६०० | ०.७५०-१.००० | ३.५-४ माह |
| सूर्यमुखी | मृदुरोमिल फफूंदी | २०० | ६०० | ०.७५०-१.००० | ३.५-४ माह |
| सरसों | सफेद गेरूई | २०० | ६०० | ०.७५०-१.००० | ३.५-४ माह |

विषाक्तता के लक्षण: ज्यादा सुस्ती आना, सांस लेने में तकलीफ, आँखों में जलन, मांसपेशियों में अत डन, असामान्य अंवस्था हो सकते हैं।

विष निवारक :

कोई विशेष विष नाशक नहीं हैं, लक्षणानुसार इलाज करें।

प्राथमिक उपचार : रोगी को शुद्ध हवा में ले जाएं। यदि दवा निगल ली गई हो तो, गले में उंगली डालकर उल्टी कराएं। दूषित त्वचा को साबुन और पानी से धोएं। यदि आँखें दूषित हो जाए तो उन्हें १०-१५ मिनट तक काफी मात्रा में साफ पानी से धोएं।

उपयोगकर्ता द्वारा सावधानियाँ : १. उपयोग के समय खाना-पीना, धूम्रपान नहीं करें। २. त्वचा के संपर्क एवं श्वास द्वारा अन्दर लेने से बचें। खुले हाथों से दवा का मिश्रण ना बनायें। ३. सुरक्षात्मक कपड़े रबर के दस्ताने, जूते, मास्क, रबर एप्रोन एवं टोपी का उपयोग करें।

भणडारण : ठंडे, सूखे, हवादार, अंधेरे स्थान पर, जलती आग, खाद्य पदार्थो, पालतू पशु एवं बच्चों की पहूंच से दूर ताला लगाकर रखें।

खाली डिब्बों को नष्ट करना : खाली डिब्बों को तोडकर जमीन में गाडना चाहिये एवं पुनः उपयोग में ना लायें। अतिरिक्त पदार्थ को धोकर सुरक्षित तरीकों से नष्ट कर देना चाहिये, ताक्रि जल एवं वातावरण प्रदूषित न हों।

वारण्टी : हमारे द्वारा उत्पादित वस्तुएं एकसार गुणवत्ता के हैं। परन्तु इसका उपयोग हमारे नियंत्रण से बाहर है। उपभोक्ता एवं विक्रेता द्वारा किये जाने वाले भण्डारण, उपयोग और उपयोग के साधनों पर हमारा नियंत्रण नहीं है अतःहम व हमारे विक्रेता किसान की असावधानी के कारण फसल, उपकरण एवं किसान को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होने वाले नुकसान की जिम्मेवारी लेने में असमर्थ हैं।

# মেটাল্যাক্সিল 35% ডাবলু.এস. (প্রণালীগত ছত্রাকনাশক)

মাক্স মেটাল্যাক্সিল ৩৫% ডাবলুএস একটি অতি সক্রিয় এবংপ্রণালীগত ছত্রাকনাশক যা সক্রিয় উপাদান হিসাবে মেটাল্যাক্সিল নির্ভর। এর প্রতি কেজিতে জে.কে. প্রোডাক্টের ৩৫০ গ্রাম সক্রিয় উপাদান রয়েছে। এটিকে জলে কাদার মতো করে তা দিয়ে বীজের ড্রেসিং করা হয়।

**সুপারিশ:**

| শস্যসমূহ | কীটপতঙ্গের সাধারণ নাম | নমারাষ্টকের এ.আই. (গ্রাম) | জলে প্রস্তুতি (গ্রাম) | শেষদশম প্রবেশিতা (লিটার) | স্প্রে ও ফসল তোলার অন্তর্বর্তী সময়কাল (দিন হিসাবে) |
|---|---|---|---|---|---|
| ভুট্টা | জোয়ার গাছের ডাউনি মিলডিউ | প্রতি ১০০ কেজি বীজকে ২৪০ গ্রাম ছত্রাকনাশকের কাই বানিয়ে তাতে পরিশুদ্ধ করতে হবে। | ৭০০ গ্রাম / ১০০ কেজি বীজ | ০.৭৫-১.০ / ১০০কেজি বীজ | ৩-১/২-৪ মাস বীজের প্রকৃতি অনুযায়ী |
| | আখ চাষের ডাউনি মিলডিউ বাদামী তোরকাটা ডাউনি মিলডিউ | | | | |
| বাজরা | ডাউনি মিলডিউ | প্রতি ১০০ কেজি বীজকে ২০০ গ্রাম ছত্রাকনাশকের কাই বানিয়ে তাতে পরিশুদ্ধ করতে হবে। | ৬০০ গ্রাম / ১০০ কেজি বীজ | ০.৭৫-০.১/ ১০০কেজি বীজ | ৩.০-৩.১/২ মাস বীজের প্রকৃতি অনুযায়ী |
| জোয়ার | ডাউনি মিলডিউ | প্রতি ১০০ কেজি বীজকে ২০০ গ্রাম ছত্রাকনাশকের কাই বানিয়ে তাতে পরিশুদ্ধ করতে হবে। | ৬০০ গ্রাম / ১০০ কেজি বীজ | ০.৭৫-১.০/ ১০০কেজি বীজ | ৩.০-৩.১/২ মাস বীজের প্রকৃতি অনুযায়ী |
| সূর্যমুখী | ডাউনি মিলডিউ | প্রতি ১০০ কেজি বীজকে ২০০ গ্রাম ছত্রাকনাশকের কাই বানিয়ে তাতে পরিশুদ্ধ করতে হবে। | ৬০০ গ্রাম / ১০০ কেজি বীজ | ০.৭৫-১.০/ ১০০কেজি বীজ | ৩ ১/২-৪ মাস বীজের প্রকৃতি অনুযায়ী |
| সরিষা | ডাউনি মিলডিউ | প্রতি ১০০ কেজি বীজকে ২০০ গ্রাম ছত্রাকনাশকের কাই বানিয়ে তাতে পরিশুদ্ধ করতে হবে। | ৬০০ গ্রাম / ১০০ কেজি বীজ | ০.৭৫-১.০/ ১০০কেজি বীজ | ৩ ১/২-৪ মাস বীজের প্রকৃতি অনুযায়ী |

**ব্যবহারের নির্দেশিকা:** ছোট লটের জন্য প্রতি কেজিবীজপরিশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমান মেটাল্যাক্সিল ৩৫% ডাবলুএস ১০-২০ মিলি জলে মিশিয়ে কাই প্রস্তুত করতে হবে। বীজদের কাই এর সাথে মেশান এবং ধারকপাত্রটিকে ঘোরান বা নাড়াতে থাকুন যতক্ষণ না সমস্ত বীজের গায়ে সমান ভাবে লাগছে। সাধারনত: এক মিনিটেরও কম সময়। মেটাল্যাক্সিল ৩৫ ডাবলুএস প্রয়োগের জন্য কাই বানিয়ে নেবার এবংবানিজ্যিক ভাবে অবিরত ব্যবহৃত বীজপরিশোধনের উপকরণ দিয়ে সুপারিশ করা হচ্ছে।

**সতর্কতা:** ১. খাদ্যদ্রব্য, খালি খাবারের ধারকপাত্র এবংপশুখাদ্য থেকে দূরে রাখুন। ২. মুখ, চোখ ও চামড়ার সংস্পর্শে যেন না আসে। ৩। প্রয়োগের সময় যেন ছাগের সাথে নাকে না যায়। ৪. খুব ভালোভাবে ছত্রাকনাশক লেগে যাওয়া জামাকাপড় এবংশরীরের যে অংশে লেগেছে, তা ধুয়ে ফেলুন। ৫. প্রয়োগ করাকালীন ধূমপান করবেন না, কোন কিছু পান করবেন না, কিছু খাবেন না বা চিবাবেন না। ২. মেশানোর সময় সম্পূর্ণ সুরক্ষাদায়ী পোশাক পরে থাকুন।

**বিষক্রিয়ার উপসর্গ:** আলস্য, শ্বাস নিতে কষ্ট, চোখে যন্ত্রণা, পেশির সংকোচন, অস্বাভাবিক দেহভঙ্গি শুরু হতে পারে

**প্রাথমিক চিকিৎসা:** ১. গিলে ফেলে থাকলে আক্রান্ত ব্যক্তির গলার পিছন দিকটায় শুড়শুড়ি দিয়ে বমি করাবার চেষ্টা করতে হবে, প্রচুর পরিমাণ জল খাওয়াতে হবে এবংগ্যাসট্রিক ল্যাভেজের জন্য চিকিৎসকের সহায়তা নিতে হবে। ২. যদি পোশাক ও চামড়ায় লেগে যায় তাহলে সেই পোশাক ও চামড়ার লেগে থাকা অংশ প্রচুর পরিমান সাবান ও জল দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। ৩. যদি চোখে গিয়ে থাকে তাহলে ১০ থেকে ১৫ মিনিট ধরে প্রচুর পরিমান স্যালাইন বা পরিশুদ্ধ জলের ঝাপটা দিন ৪. যদি দ্বাণের সাথে শরীরে যায়, তাহলে রোগীকে তাজা হাওয়ায় আনতে হবে।

**গাছের উপর টক্সিক প্রভাব:** এই উৎপাদনটি ফাইটোটক্সিক নয় অর্থাৎ সুপারিশকৃত মাত্রায় ব্যবহার করলে গাছের বৃদ্ধির উপর ক্ষতিকর টক্সিক প্রভাব পড়ে না।

**প্রতিষেধক :** বিশেষ কোন প্রতিষেধক জানা নেই। উপসর্গ অনুযায়ী চিকিৎসা করতে হবে।

**ব্যবহৃত ধারকপাত্রগুলির সুষ্ঠু বন্দোবস্ত :** ১) প্রস্তুতকারক, কীটনাশক মিশ্রণকারী ও ব্যবহারকারীদের কর্তব্য হলো কীটনাশকের প্যাকেট বা অতিরিক্ত বিষাক্ত দ্রব্যগুলির সুষ্ঠু বন্দোবস্ত করা এবং তা নিরাপদ উপায়ে ধুয়ে ফেলা যাতে পরিবেশ ও জল দূষণ রোধ করা যায়। ২) পুনরায় ব্যবহার রোধ করার জন্য ব্যবহৃত কীটনাশকের ধারকপাত্রগুলিকে বাইরে ফেলে রাখা যাবে না। ৩) খালি ধারকপাত্রগুলিকে ভেঙে ফেলে লোকালয় থেকে দূরে কোথাও পুঁতে ফেলতে হবে।

**সংরক্ষণ কিভাবে করতে হবে :** ১) অন্যান্য জিনিসপত্র রাখা আছে এমন জায়গা থেকে অনেক দূরে কীটনাশক সহ প্যাকেট তার পরিমান ও প্রকৃতি অনুযায়ী কোন অন্য বাড়িতে বা আলাদা ঘরে তালাচাবি দেওয়া অবস্থায় আলমারির ভিতরে সংরক্ষণ করতে হবে। ২) যে ঘরে কীটনাশক মজুত করা হবে সেটির গঠন শক্তপোক্ত হওয়া চাই এবং সেটিকে শুকনো, ভালোভাবে আলোকিত, যথেষ্ট আলোবাতাস চলাচলকারী জায়গা সমন্বিত হতে হবে। বাস্পের মাধ্যমে বিষক্রিয়া প্রতিরোধ করার জন্য।

**রাসায়োনিক গঠন:**

| | |
|---|---|
| মেটাল্যাক্সিল সক্রিয় উপাদান (৯০% ওজন/ওজন সক্রিয় উপাদান নির্ভর) | : ৩৮.৯০০% ওজন/ওজন |
| ওয়েটিং এজেন্ট: স্টেরইল রেজ্জিমিডাজোল ডাইসালফোনিক অ্যাসিড) | : ৩.০০০% ওজন/ওজন |
| ডিসপার্সিং এজেন্ট: (ফরম্যালডিহাইডের কনডেনসেট ও ন্যাপথালীন ফেনল সালফোনিক অ্যাসিড সোডিয়াম সল্ট) | : ৭.০০০% ওজন/ওজন |
| স্টিকিং এজেন্ট (কার্বক্সি মথাইল সেলুলোজ) | : ০.২০০% ওজন/ওজন |
| কাওলিন, সাইলিসিক অ্যাসিড | : ৫০.৯০০% ওজন/ওজন |
| মোট | : ১০০.০০০% ওজন/ওজন |

# ମଟୋଲାକ୍ସିଲ୍ 35% WS | ସିଷ୍ଟମ୍ ଫଙ୍ଗିସିଡ୍ |

**ସତର୍କତା: "ଅନ୍ୟ ଫସଲରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ | ଏହି ଲେବେଲ୍ / ଲିଫଲେଟ୍ ରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଠାରୁ ଅଧିକ |**

**ପରିଚୟ:** ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟଧିକ ସକ୍ରିୟ ସିଷ୍ଟମିକ୍ ଫଙ୍ଗିସାଇଡ୍ | ଏହା ଏକ ଓଦା ସ୍ଲୁରି ବିହନ ଡ୍ରେସରେ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ସେ ରିଷ୍ଟରେ କଳଙ୍କଡ଼କୁ ଯିବାବେଳେ ଏହା ମକା, ବାଜରା, ସେ ରିଷ୍ଟ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀରେ ନିମ୍ନ ମୃଦୁକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ |

**ସୁପାରିଶ:**

| Crop(s) | Common Name of disease | Dosage per 100kg seed A.I. (gm) | Formulation (gm) | Dilution in water (Ltr.) | Waiting Period Months |
|---|---|---|---|---|---|
| ମାଢି | ସେ ରିମ୍ ନିମ୍ନ ମୃଦୁ<br>ଆଖୁ ସ୍ପରାଗ ମୃଦୁ<br>ଫିଲିପାଇନ୍ |ନିମ୍ନ ମୃଦୁ<br>ବ୍ରାଉନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇପ୍ |<br>ନିମ୍ନ ମୃଦୁ | 240 | 700 | 0.750- 1.000 | 3.5-4.0 |
| ବାଜ୍ରା | ଡାଉନ ମୃଦୁ | 200 | 600 | 0.750- 1.000 | 3.0-3.5 |
| ସେ ରିଷ | ଡାଉନ ମୃଦୁ | 200 | 600 | 0.750- 1.000 | 3.5-4.0 |
| ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ | ଡାଉନ ମୃଦୁ | 200 | 600 | 0.750- 1.000 | 3.5-4.0 |
| ସେ ରିଷ | ଧଳା କଳଙ୍କ | 200 | 600 | 0.750- 1.000 | 3.5-4.0 |

**ବିଷର ଲକ୍ଷଣ:** ଲଘୁତାପ, ନି hing ଶ୍ୱାସ ନବୋଧର ଅସୁବିଧା, ଆଖିରେ ଉତ୍ତେଜନା, ମାଂସପେଶୀରେ ସ୍ପାଷ୍ଟିକ୍, ଅସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥିତି ହେ ।ପାରେ |

**ପ୍ରତିକାର:** କ specific ଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରତିକାର ନାହିଁ ଲକ୍ଷଣଗତ ଭାବରେ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ |

**ପ୍ରଥମ ସହାୟତା:** ରୋଗୀକୁ ସତେଜ ପବନରେ ବାହାର କର | ଯଦି ଗିଳି ଦିଆଯାଏ, ଗଳାର ପଛ ପଟକୁ ଟିକ୍ କରି ବାନ୍ତି କର | ଦୂଷିତ ଚର୍ମକୁ ସାବୁନ ଏବଂ ପାଣିରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ | ଅତି କମରେ 10-15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ପରିଷ୍କାର ପାଣିରେ ଆଖିକୁ ଘଷନ୍ତୁ |

**ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସତର୍କତା:** ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସମୟରେ ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଧୂମପାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ | 2। ନିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଚର୍ମ ସମ୍ପର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ | ଖାଲି ହାତରେ ମିଶାନ୍ତୁ ନାହିଁ | 3। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଣ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପୋଷାକ, ରବର ଗ୍ଲୋଭସ୍, ବୁଟ୍, ଫେସ୍ ମାସ୍କ ଏବଂ ରବର ଆପ୍ରନ୍ ହୁଡ କିମ୍ବା ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |

**ସଂରକ୍ଷଣ:** ଅଣ୍ଡା ଶୁଖିଲା, ଭଲ ଚାଳିତ ସ୍ଥାନରେ ତାଲା ତଳେ ଏବଂ ଚାବି ଖୋଲା ନିଆଁ, ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ, ଶିଶୁ ଏବଂ ପଶୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ |

**ନିଷ୍କାସନ:** ପୁନ use ବ୍ୟବହାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପ୍ୟାକେଜଗୁଡିକ ଭାଙ୍ଗିଦିଅ ଏବଂ ବାସସ୍ଥାନଠାରୁ ଦୂରରେ ପୋତି ଦିଆଯିବ | ଅତିରିକ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଧୋଇବାକୁ ନିରାପଦ ଉପାୟରେ ନିଷ୍କାସନ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ | ଯେପରି ରୋକିବା ପାଇଁ | ପରିବେଶ ଏବଂ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ |

**ୱାରେଣ୍ଟି:** ଆମ ଦ୍ lied ାରା ଯୋଗାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ମାନକ ଏବଂ ସମାନ ଗୁଣର ଏବଂ ଆମର | ବିଶ୍ୱାସ କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ | ଯେହେତୁ ସମୋନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଆମର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ଏବଂ ଆମେ ସଂରକ୍ଷଣ କିମ୍ବା ପରିଚାଳନା, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ପ୍ରୟୋଗ ଲିଡ୍ଯାଦି ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟୟାୟାମ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ନା ଆମେ କିମ୍ବା ବିକ୍ରେତାମାନେ କ any ଣସି ନିଶ୍ଚିତ କରୁନାହିଁ | ବାଧିତ୍ | ପାଇଁ ଯେକେ any ଣସି କ୍ଷତି ଆଘାତ କିମ୍ବା ଯେକେ any ଣସି ଏହାର ପରିଣାମ ଫସଲ ଦ୍ caused ାରା ଉତ୍ପନ୍ନ ଉପକରଣ କିମ୍ବା କର୍ମଚାରୀ |

# Vilaxil

## METALAXYL 35% WS

## SYSTEMIC FUNGICIDE

# भिलाक्सिल

**मैटालेक्सिल ३५% डब्ल्यू.एस.**
**अंत:प्रवाही फफूंदीनाशक**

# ভিলাক্সিল

মেটাল্যাক্সিল 35% ডাবলু.এস. (প্রণালীগত ছত্রাকনাশক)

# ଭିଲାକ୍ସିଲ

ମଟୋଲାକ୍ସିଲ୍ 35% WS |
ସିଷ୍ଟମ୍ ଫଙ୍ଗିସିଡ୍ |

**CAUTION : NOT TO BE USED ON CROPS OTHER THAN SPECIFIED ON THIS LABEL/LEAFLET**


**Manufactured By:**

**Vedic Agro Science Pvt. Ltd.**

(An ISO 9001 : 2015 & 14001 : 2015 Certified Company)
40, Strand Road, 5th Floor, Room No. 26
Kolkata - 700 001, West Bengal
Helpline : 033 2262 2441
E-mail : vedic@vedicagro.com

**Manufacturer Premises:**

Vill. Baligori, P.O. Baligori,
P.S.: Tarakeswar, Dist.: Hooghly
West Bengal, Pin.: 712 410


# మెటలాగ్జిన్ 35% డబ్ల్యు.యస్.

## అంతర్యాహిక శిలీంధ్రనాశని

హెచ్చరిక : జతపరచిన కరపత్రములో పేర్కొన్న పైర్లపైనే ఈ మందును ఉపయోగించవలెను. మిగతాపైర్లపై ఉపయోగించరాదు.

## SYSTEMIC FUNGICIDE

ఒక అత్యంత ప్రభావితంగల అంతర్యాహక శిలీంధ్రనాశిని, దీనిని విత్తన శుద్ధికి ఉపయోగించెదరు. ఇది మొక్కజొన్న, సజ్జ మరియు ప్రొద్దు తిరుగుడు ఆశించు బూజుతెగులును అదేవిధముగా ఆపంటపై వచ్చు తెల్లతుప్పును సమర్థవంతంగా అరికడుతుంది.

వాడు విధానము :

| పంట | ఆశించు తెగులు | 100 కి.గ్రా. విత్తనానికి మూల గ్రాములు (గ్రా.) | మోతాదు సూత్రీకరణ | వేచివుండు కలుపవలసిన నీరు | సమయం |
|---|---|---|---|---|---|
| మొక్కజొన్న | జొన్న బూజు తెగులు<br>చెరకు బూజు తెగులు<br>ఫిలిప్పిన్ బూజు తెగులు<br>గోధుమ చారల బూజు తెగులు | 240 | 700 | 0.750-1.000 | 3.5-4.0 నెలలు |
| సజ్జ | బూజు తెగులు | 200 | 600 | 0.750-1.000 | 3.0-3.5 నెలలు |
| జొన్న | బూజు తెగులు | 200 | 600 | 0.750-1.000 | 3.5-4.0 నెలలు |
| ప్రొద్దుతిరుగుడు | బూజు తెగులు | 200 | 600 | 0.750-1.000 | 3.5-4.0 నెలలు |
| ఆవాలు | తెల్లతుప్పు | 200 | 600 | 0.750-1.000 | 3.5-4.0 నెలలు |

విషలక్షణాలు :

నోటి నుండి నురగ, శ్వాస పీల్చుటలో ఇబ్బంది, కళ్ళు నుండి నీరుకారుట, కండరాల నొప్పి విపరీతమైన అలజడి.

విరుగుడు :

ప్రత్యేకించి ఏమీ లేదు, కానీ విషలక్షణాలను బట్టి చికిత్స చేయవలెను.

ప్రథమ చికిత్స :

రోగిని చల్లటిగాలి తగిలే విధముగా ఉంచవలెను. ఒకవేళ మందు పీల్చిన యెడల వాంతి వచ్చే విధముగా చేయవలెను. శరీరం మీద మందు పడిన చోట సబ్బు నీటితో శుభ్రంగా కడగవలెను. ఒక వేళ మందు కంటిలో పడినచో ధారాళమైన, శుభ్రమైన నీటితో కంటిని సుమారు 10 నుండి 15 ని॥ల పాటు కడుగవలెను.

వాడువారు తీసుకొనవలసిన జాగ్రత్తలు :

1. మందు ఉపయోగించునపుడు నీరు త్రాగుట, తినుట, ధూమపానం చేయగూడదు.
2. మందును పీల్చుట, చర్మానికి తగిలించుకొనుట చేయరాదు. చేతి తొడుగులు లేకుండా మందును చేతులతో కలుపరాదు.
3. పూర్తిస్థాయి రక్షణ వస్త్రాలు, రబ్బరు తొడుగులు, బూట్లు శిరస్త్రాణము లేదా టోపీ ధరించవలెను.

నిల్వ చేయు విధానము :

చల్లని, పొడియైన, చక్కటి గాలి వెలుతురు వచ్చే ప్రదేశంలో అగ్నికి, ఆహార పదార్థములకు, చిన్న పిల్లలకు మరియు జంతువులకు దూరంగా తాళము వేసి వుంచవలెను.

ఖాళీ డబ్బాలను పారవేయు విధానము :

ఖాళీ డబ్బాలను తిరిగి ఉపయోగించుటకు వీలుపడని విధంగా పగులగొట్టుట లేదా భూమిలో పూడ్చి వేయుటగాని చేయవలెను. మిగిలిపోయిన మందును మరియు మందుకడిగిన నీటిని సురక్షితమైన పద్ధతులలో నీటి కాలుష్యం కాకుండా పర్యావరణ అనుగుణంగా పారవేయవలెను.

ప్రమాణము :

మావే సరఫరా చేయబడిన అన్ని మందులు ఒకే రకమైన నాణ్యత మరియు ప్రమాణము కలిగి యున్నవని మరియు వాటిని ఉపయోగించుటకు సరియైన పని మేము నమ్ముచున్నాము. వాటిని నిల్వ చేయుటలో గాని, వాడుటగాని మాయియంత్రణలో లేనందువలన ఏరకమైన నష్టానికైనా, పంటల నష్టానికైనా, గాయాలకైనా, వాడుటకు ఉపయోగించే పరికరాలకైనా మేము మరియు అమ్మకందార్లు బాధ్యతకు ఎటువంటి హామీ ఇవ్వజాలము.


For any complaints contact customer service Executive.
**Vedic Agro Science Pvt. Ltd.**
Corp. Off : 40, Strand Road, 5th Floor, Room No. 26
Kolkata - 700 001, West Bengal
Helpline : 033 2262 2441
Email : vedic@vedicagro.com